



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ภาคผนวก ก

ตารางแสดงลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา

ตาราง 1ก เพศผู้ป่วยแยกตามสภาวะการค้ำเครื่องค้ำที่มีแอลกอฮอล์

สภาวะการค้ำ	เพศผู้ป่วย				รวม	
	เพศชาย		เพศหญิง		จำนวน(คน)	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยค้ำ	44	14.67	76	25.33	120	40.00
ค้ำหนักในปัจจุบัน	13	4.33	4	1.33	17	5.67
ค้ำไม่หนักในปัจจุบัน	35	11.67	11	3.67	46	15.34
เคยค้ำหนักและเพิ่งเลิก	21	7	1	0.33	22	7.33
เคยค้ำหนักและเลิกมานาน	18	6	-	-	18	6.00
เคยค้ำไม่หนักและเพิ่งเลิก	44	14.67	8	2.67	52	17.33
เคยค้ำไม่หนักและเลิกมานาน	24	8	1	0.33	25	8.33
รวม	199	66.34	101	33.66	300	100

หมายเหตุ: สภาวะการค้ำ หาได้จากจำนวนหน่วยสุราที่ค้ำในหนึ่งสัปดาห์ ถ้าค้ำมากกว่า 21 หน่วยสุราต่อสัปดาห์

ในเพศชาย และค้ำมากกว่า 14 หน่วยสุราในเพศหญิง

ถ้าเลิกค้ำมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี แสดงว่าเลิกค้ำมานานแล้ว แต่ถ้าเลิกค้ำน้อยกว่า 10 ปี แสดงว่าเพิ่งเลิกค้ำ

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 2ก อายุผู้ป่วยที่จัดเป็น 3 กลุ่มแยกตามสภาวะการค้ำ

สภาวะการค้ำ	กลุ่มอายุผู้ป่วย						รวม	
	อายุ 13-34 ปี		อายุ 35-64 ปี		อายุ 65 ปีขึ้นไป		จำนวน (คน)	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยค้ำ	10	3.33	72	24	38	12.68	120	40.00
ค้ำหนักในปัจจุบัน	13	4.33	4	1.33	-	-	17	5.67
ค้ำไม่หนักในปัจจุบัน	27	9	19	6.33	-	-	46	15.34
เคยค้ำหนักและเพิ่งเลิก	4	1.33	18	6	-	-	22	7.33
เคยค้ำหนักและเลิกมานาน	-	-	12	4	6	2	18	6.00
เคยค้ำไม่หนักและเพิ่งเลิก	3	1	46	15.33	3	1	52	17.33
เคยค้ำไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	5	1.67	20	6.67	25	8.33
รวม	57	18.99	176	58.66	67	22.35	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 3ก อาชีพของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	อาชีพผู้ป่วย									
	ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว		พนักงานบริษัท		ผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกร		เกษียณอายุ		ว่างงานหรือกำลังหางาน	
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	8	2.67	4	1.33	2	0.67	60	20.0	-	-
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	5	1.67	4	1.33	1	0.33	1	0.33
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	8	2.67	7	2.33	4	1.33	3	1.00	1	0.33
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	4	1.33	1	0.33	2	0.67	4	1.33	-	-
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	2	0.67	11	3.67	-	-
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	8	2.67	1	0.33	1	0.33	11	3.67	-	-
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	20	6.67	-	-
รวม	28	9.34	18	5.99	15	5	110	36.67	2	0.66

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 3ก (ต่อ) อาชีพของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	อาชีพผู้ป่วย								รวม	
	ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ		เกษตรกรหรือรับจ้าง		แม่บ้าน		นักเรียนหรือนักศึกษา			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	8	2.67	27	9.00	9	3	2	0.67	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	4	1.33	-	-	-	-	2	0.67	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	5	1.67	11	3.67	1	0.33	6	2.00	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	2	0.67	9	3.00	-	-	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	-	-	5	1.67	-	-	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	6	2.00	25	8.33	-	-	-	-	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	25	8.33
รวม	26	8.67	81	27.00	10	3.33	10	3.34	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 4ก ระดับการศึกษาของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ระดับการศึกษาของผู้ป่วย							
	ไม่ได้เรียนหนังสือ		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษา		อาชีวศึกษา	
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	22	7.34	72	24.0	13	4.33	5	1.67
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	1	0.33	7	2.33	4	1.33
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	-	-	11	3.67	14	4.67	10	3.33
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	2	0.67	9	3	8	2.67	1	0.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	1	0.33	14	4.67	2	0.67	-	-
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	4	1.33	29	9.67	11	3.67	4	1.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	6	2	16	5.33	1	0.33	2	0.67
รวม	35	11.67	152	50.67	56	18.67	26	8.66

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 4ก (ต่อ) ระดับการศึกษาของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ระดับการศึกษาของผู้ป่วย				รวม	
	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า		ปริญญาโทหรือสูงกว่า		จำนวน	(%)
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)		
ไม่เคยดื่ม	7	2.33	1	0.33	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	5	1.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	9	3	2	0.67	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	2	0.67	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	1	0.33	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	4	1.33	-	-	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	25	8.33
รวม	28	9.33	3	1.00	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 5ก รายได้ในปัจจุบันของผู้ป่วยที่จัดเป็น 8 กลุ่มแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	กลุ่มรายได้ปัจจุบันของผู้ป่วย (บาท)							
	ไม่มีรายได้		น้อยกว่า 5,000		5,001-10,000		10,001-15,000	
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	66	22	33	11	11	3.67	4	1.33
ดื่มหนักในปัจจุบัน	4	1.33	2	0.67	6	2	3	1
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	10	3.33	15	5	11	3.67	2	0.67
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	2	0.67	11	3.67	5	1.67	-	-
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	9	3	6	2	1	0.33	1	0.33
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	11	3.67	22	7.33	8	2.67	2	0.67
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	18	6	4	1.33	3	1	-	-
รวม	120	40.00	93	31.00	45	15.01	12	4.00

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 5ก (ต่อ) รายได้ในปัจจุบันของผู้ป่วยที่จัดเป็น 8 กลุ่มแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	กลุ่มรายได้ปัจจุบันของผู้ป่วย (บาท)								รวม	
	15,001-20,000		20,001-25,000		25,001-30,000		30,000 ขึ้นไป			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	4	1.33	-	-	-	-	2	0.67	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	4	1.33	2	0.67	-	-	2	0.67	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	1	0.33	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	3	1.00	-	-	5	1.67	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8.33
รวม	13	4.32	6	2.00	6	2.00	5	1.67	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 6ก เขตชุมชนที่ผู้ป่วยอยู่อาศัยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	เขตชุมชนที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย				รวม	
	อยู่นอกเขตเทศบาล		อยู่ในเขตเทศบาล			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยดื่ม	85	28.33	35	11.67	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	13	4.33	4	1.33	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	30	10.0	16	5.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	13	4.33	9	3.00	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	12	4.0	6	2.00	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	43	14.33	9	3.00	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	17	5.68	8	2.67	25	8.33
รวม	213	71	87	29	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 7ก จำนวนปีที่ผู้ป่วยเคยดื่มแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนปีที่ผู้ป่วยดื่ม							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	9.44	1	20	6	8.12	1.272	5.243
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	25.56	1	35	10	12.54	1.316	8.929
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	12.22	3	30	20	15.91	1.628	7.634
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	10.00	15	35	25	24.72	1.308	5.550
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	52	28.89	1	50	20	19.77	1.450	10.454
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	13.89	10	50	20	24.80	2.131	10.654
รวม	180	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 8k จำนวนปีที่ผู้ป่วยได้เลิกดื่มแล้วแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนปีที่ผู้ป่วยเลิกดื่ม (ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	18.80	1	8	1	1.59	0.442	2.074
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	15.39	10	20	13	14.11	0.758	3.216
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	52	44.44	1	7	1	1.69	0.213	1.533
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	21.37	10	40	10	16.20	1.715	8.573
รวม	117	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 9ก จำนวนสุราที่ดื่มเฉลี่ยต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนสุราที่ดื่มเฉลี่ย (หน่วยสุรา/วัน)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	9.50	5	30	10	11.88	1.569	6.470
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	25.70	1	10	3	3.50	0.304	2.063
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	12.29	4	20	10	11.32	1.064	4.989
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	10.05	3	20	5	7.44	1.079	4.579
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	28.49	1	20	3	4.80	0.590	4.257
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	13.97	1	10	2	3.08	0.506	2.532
รวม	179	100						

หมายเหตุ: 1 หน่วยสุรา (Units) คือ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปในร่างกายโดยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ละชนิดจะมีปริมาณที่ต่างกันดังนี้ สำหรับเบียร์ คือดื่ม 360 ซีซี ไวน์คือดื่ม 150 ซีซี เหล้าคือดื่ม 45 ซีซี

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 10ก จำนวนเบียร์ที่ดื่มเฉลี่ยต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนเบียร์ที่ดื่มเฉลี่ย (หน่วยสุรา/วัน)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	12.14	2	10	5	5.59	0.748	3.083
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	44	31.43	1	18	2	3.87	0.597	4.048
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	15	10.71	1	2	2	1.36	0.203	6.035
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	13	9.29	1	9	2	2.17	0.538	2.282
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	45	32.14	1	18	3	3.87	0.536	3.866
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	6	4.29	2	10	0	1.16	0.559	2.794
รวม	140	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 11ก จำนวนสุราที่ดื่มมากที่สุดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนสุราที่ดื่มมากที่สุด (หน่วยสุรา/วัน)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	9.50	6	60	30	28.24	3.781	15.591
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	25.70	2	60	10	12.11	1.562	10.594
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	12.29	10	50	20	25.91	2.519	11.816
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	10.05	5	40	10	13.39	2.104	8.925
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	28.49	2	50	10	13.79	1.668	12.028
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	13.97	2	30	5	8.52	1.701	8.505
รวม	179	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 12ก จำนวนเบียร์ที่ดื่มมากที่สุดต่อวันของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนเบียร์ที่ดื่มมากที่สุด (หน่วยสุรา/วัน)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	12.14	6	40	12	16.29	2.574	10.611
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	44	31.43	2	40	9	10.09	1.224	8.299
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	15	10.71	2	50	10	13.00	2.798	13.126
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	13	9.29	3	20	5	6.39	1.524	6.464
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	45	32.14	1	35	7.5	9.62	1.200	8.650
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	6	4.29	4	36	0	3.88	1.782	8.908
รวม	140	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 13ก สภาวะร่างกายของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	กลุ่มสภาวะร่างกายของผู้ป่วย										รวม	
	ผอมมาก		พอดีตัว		อ้วน		อ้วนมาก ระดับ 1		อ้วนมาก ระดับ 2			
	จำ นวน	(%)	จำ นวน	(%)	จำ นวน	(%)	จำ นวน	(%)	จำ นวน	(%)	จำ นวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	26	8.68	56	18.67	25	8.34	10	3.33	3	1	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	2	0.67	11	3.67	3	1	1	0.33	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	13	4.33	15	5	9	3	8	2.67	1	0.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	10	3.33	8	2.67	3	1	1	0.33	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	2	0.67	15	5	1	0.33	-	-	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	19	6.33	25	8.33	6	2	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกนาน	1	0.33	14	4.67	7	2.33	3	1	-	-	25	8.33
รวม	53	17.67	129	43.01	81	27	31	10.33	6	1.99	300	100

หมายเหตุ: สภาวะร่างกายของผู้ป่วย หาได้จากดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) ของผู้ป่วย จะอยู่ในรูปส่วนสูงและน้ำหนัก
คำนวณได้โดยนำน้ำหนัก (กิโลกรัม) คูณด้วย 10,000 และนำไปหารด้วยส่วนสูง (เซนติเมตร) ยกกำลังสอง โดยค่า BMI
น้อยกว่า 18.5 คือ ผู้ป่วยมีร่างกายผอมมาก ค่า BMI อยู่ระหว่าง 18.5-22.9 คือ ผู้ป่วยมีน้ำหนักพอดีตัว ค่า BMI อยู่
ระหว่าง 23-24.9 คือ ผู้ป่วยมีร่างกายอ้วน ค่า BMI อยู่ระหว่าง 25-29.9 คือ ผู้ป่วยมีร่างกายอ้วนมากระดับ 1 และค่า BMI
มากกว่า 30 คือ ผู้ป่วยที่มีร่างกายอ้วนมากระดับ 2

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 14 ก ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งหน้าอกแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	มะเร็งหน้าอก (Breast Cancer)								รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	3	0.99
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
รวม	1	0.33	3	0.99	-	-	1	0.33	5	1.65

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 15k ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แยกตามสภาวะการดื้อ

สภาวะการดื้อ	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer)								รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื้อ	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
ดื้อหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื้อไม่หนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื้อหนักและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
เคยดื้อหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื้อไม่หนักและเพิ่งเลิก	-	-	2	0.66	-	-	-	-	2	0.66
เคยดื้อไม่หนักและเลิกมานาน	2	0.66	1	0.33	-	-	-	-	3	0.99
รวม	2	0.66	4	1.32	-	-	1	0.33	7	2.31

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 16k ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งตับแยกตามสภาวะการดื้อ

สภาวะการดื้อ	มะเร็งตับ (Liver Cancer)								รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื้อ	3	0.99	-	-	-	-	1	0.33	4	1.32
ดื้อหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื้อไม่หนักในปัจจุบัน	3	0.99	1	0.33	-	-	-	-	4	1.32
เคยดื้อหนักและเพิ่งเลิก	3	0.99	-	-	-	-	-	-	3	0.99
เคยดื้อหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.66
เคยดื้อไม่หนักและเพิ่งเลิก	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
เคยดื้อไม่หนักและเลิกมานาน	2	0.66	-	-	-	-	-	-	2	0.66
รวม	11	3.63	2	0.66	1	0.33	2	0.66	15	5.28

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 17k ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งคอหอยแยกตามสภาวะการดื้อ

สภาวะการดื้อ	มะเร็งคอหอย (Oral/Pharyngeal Cancer)								รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื้อ	2	0.66	-	-	-	-	-	-	2	0.66
ดื้อหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื้อไม่หนักในปัจจุบัน	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
เคยดื้อหนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
เคยดื้อหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื้อไม่หนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.66
เคยดื้อไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5	1.65	1	0.33	-	-	-	-	6	1.98

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 18k ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในปากและช่องปากแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	มะเร็งในปากและช่องปาก (Oropharyngeal Cancer)								รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	2	0.66	2	0.66
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1	0.33	1	0.33	-	-	2	0.66	4	1.32

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 19k ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	มะเร็งหลอดอาหาร (Oesophageal Cancer)								รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	2	0.66	2	0.66	1	0.33	1	0.33	6	1.98
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.66
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2	0.66	3	0.99	1	0.33	2	0.66	8	2.64

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 20k ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)								รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่ม	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3	0.99	-	-	1	0.33	-	-	4	1.32

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 21ก ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่แยกตามสภาวะการตั้งครรภ์

สภาวะการตั้งครรภ์	มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)								รวม	
	ระยะที่ 1		ระยะที่ 2		ระยะที่ 3		ระยะที่ 4			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยตั้งครรภ์	5	1.67	-	-	-	-	-	-	5	1.67
ตั้งครรภ์ในปัจจุบัน	2	0.66	-	-	-	-	-	-	2	0.66
ตั้งครรภ์ไม่หนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยตั้งครรภ์หนักและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยตั้งครรภ์หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยตั้งครรภ์ไม่หนักและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยตั้งครรภ์ไม่หนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7	2.33	-	-	-	-	-	-	7	2.33

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 22k ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจแยกตามสภาวะการตั้งครรภ์

สภาวะการตั้งครรภ์	โรคหัวใจ (Cardiomyopathy)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยตั้งครรภ์	102	34.00	18	6.00	120	40.00
ตั้งครรภ์ในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ตั้งครรภ์ไม่หนักในปัจจุบัน	44	14.66	2	0.67	46	15.34
เคยตั้งครรภ์หนักและเพิ่งเลิก	21	7.00	1	0.33	22	7.33
เคยตั้งครรภ์หนักและเลิกมานาน	15	5.00	3	1.00	18	6.00
เคยตั้งครรภ์ไม่หนักและเพิ่งเลิก	49	16.33	3	1.00	52	17.33
เคยตั้งครรภ์ไม่หนักและเลิกมานาน	23	7.67	2	0.67	25	8.33
รวม	271	90.33	29	9.67	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 23k ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงแยกตามสภาวะการตั้งครรภ์

สภาวะการตั้งครรภ์	โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยตั้งครรภ์	87	29	33	11	120	40.00
ตั้งครรภ์ในปัจจุบัน	15	5	2	0.66	17	5.67
ตั้งครรภ์ไม่หนักในปัจจุบัน	38	12.67	8	2.67	46	15.34
เคยตั้งครรภ์หนักและเพิ่งเลิก	20	6.67	2	0.66	22	7.33
เคยตั้งครรภ์หนักและเลิกมานาน	13	4.33	5	1.67	18	6.00
เคยตั้งครรภ์ไม่หนักและเพิ่งเลิก	39	13	13	4.33	52	17.33
เคยตั้งครรภ์ไม่หนักและเลิกมานาน	17	5.67	8	2.67	25	8.33
รวม	229	76.34	70	23.66	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 24k ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจอื่นๆ แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคหัวใจอื่นๆ (Other heart disease)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	109	36.34	11	3.67	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	16	5.33	1	0.33	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	41	13.67	5	1.67	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	17	5.67	1	0.33	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17.00	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	22	7.33	3	1.00	25	8.33
รวม	278	92.67	22	7.33	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 25k ผู้ป่วยด้วยโรคตับแข็งแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคตับแข็ง (Cirrhosis)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	120	40	-	-	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	15.33	-	-	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	20	6.66	2	0.67	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	17	5.67	1	0.33	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	45	15	7	2.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	23	7.67	2	0.67	25	8.33
รวม	288	96.00	12	4.00	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 26k ผู้ป่วยด้วยโรคแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal Ulcers)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	117	39	3	1	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	15	5	2	0.67	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	15.34	-	-	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	294	98.00	6	2.00	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 27k ผู้ป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบแบบเรื้อรังแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคตับอ่อนอักเสบแบบเรื้อรัง (Chronic Pancreatic)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	119	39.67	1	0.33	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	15.33	-	-	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	17	5.67	1	0.33	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	297	99.00	3	1.00	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 28k ผู้ป่วยด้วยโรคกระเพาะแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคกระเพาะ (Stomach Ulcers)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	118	39.33	2	0.67	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	44	14.67	2	0.67	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6.00	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	50	16.67	2	0.67	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	294	98.00	6	2.00	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 29k ผู้ป่วยด้วยโรคตับมันแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคตับมัน (Fatty Liver)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	120	40.00	-	-	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	16	5.34	1	0.33	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	15.33	-	-	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	20	6.67	2	0.67	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6.00	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	296	98.67	4	1.33	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 30ก ผู้ป่วยด้วยโรคตับอักเสบแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคตับอักเสบ (Hepatitis)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	117	39	3	1.00	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	15.34	-	-	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	21	7	1	0.33	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	17	5.67	1	0.33	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	24	8	1	0.33	25	8.33
รวม	293	97.68	7	2.32	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 31ก ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคเบาหวาน				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	116	38.68	4	1.33	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	45	15	1	0.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	21	7	1	0.33	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	293	97.68	7	2.32	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 32ก ผู้ป่วยด้วยโรควัณโรคแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรควัณโรค (Tuberculosis)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	119	39.67	1	0.33	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	45	15	1	0.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6.00	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	297	99.00	3	1.00	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 33k ผู้ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อส่วนปลายแขน ขา อ่อนแรงแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคกล้ามเนื้อส่วนปลายแขน ขา อ่อนแรง				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	119	39.67	1	0.33	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	44	14.67	2	0.67	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	17	5.67	1	0.33	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	52	17.33	-	-	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	296	98.67	4	1.33	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 34k ผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcohol-Dependence Syndrome)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	120	40	-	-	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	16	5.34	1	0.33	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	45	15	1	0.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	20	6.67	2	0.67	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	296	98.34	4	1.66	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 35k ผู้ป่วยด้วยโรคเกาต์แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	โรคเกาต์ (Gout)				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	117	39	3	1	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	-	-	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	45	15	1	0.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	-	-	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	51	17	1	0.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	24	8	1	0.33	25	8.33
รวม	294	98.00	6	2.00	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 36 ผู้ป่วยด้วยอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ โดยไม่ได้ตั้งใจแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ โดยไม่ได้ตั้งใจ				รวม	
	ไม่เป็น		เป็น		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	112	37.33	8	2.67	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	8	2.67	9	3	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	30	10	16	5.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	17	5.67	5	1.67	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6	-	-	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	45	15	7	2.33	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	-	-	25	8.33
รวม	255	85.00	45	15.00	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 37 การสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ผู้ป่วยสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นประจำ				รวม	
	ไม่ใช้		ใช้		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	53	17.67	67	22.33	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	8	2.67	9	3	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	24	8	22	7.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	8	2.67	14	4.66	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	4	1.33	14	4.66	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	14	4.67	38	12.67	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	17	5.67	8	2.67	25	8.33
รวม	128	42.68	172	57.32	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 38 การสูบบุหรี่ของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ผู้ป่วยสูบบุหรี่เป็นประจำ				รวม	
	ไม่ใช้		ใช้		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่เคยดื่ม	74	24.67	46	15.33	120	40.00
ดื่มหนักในปัจจุบัน	8	2.67	9	3	17	5.67
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	24	8	22	7.33	46	15.34
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	13	4.33	9	3	22	7.33
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	14	4.67	4	1.33	18	6.00
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	33	11	19	6.34	52	17.33
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	18	6	7	2.33	25	8.33
รวม	184	61.34	116	38.66	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 39 จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาพยาบาลแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาพยาบาล (ครั้ง/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	102	34.00	1	12	1	1.83	0.172	1.880
ดื่มน้ำหนักในปัจจุบัน	8	2.67	1	2	1	0.53	0.151	0.624
ดื่มน้ำหนักในปัจจุบัน	23	7.67	1	8	0.5	1.11	0.264	1.792
เคยดื่มน้ำหนักและเพิ่งเลิก	19	6.33	1	12	1	1.82	0.537	2.519
เคยดื่มน้ำหนักและเลิกมานาน	17	5.67	1	6	1	2.50	0.452	1.917
เคยดื่มน้ำหนักและเพิ่งเลิก	44	14.67	1	12	1	0.77	0.059	0.425
เคยดื่มน้ำหนักและเลิกมานาน	23	7.67	1	9	1	1.76	0.357	1.786
รวม	236	78.68						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 40 จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาพยาบาลแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาพยาบาล (ครั้ง/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	104	34.67	1	40	3	6.05	0.691	7.567
ดื่มน้ำหนักในปัจจุบัน	11	3.67	1	3	1	0.94	0.234	0.966
ดื่มน้ำหนักในปัจจุบัน	35	11.67	1	19	2	3.70	0.607	4.120
เคยดื่มน้ำหนักและเพิ่งเลิก	15	5.00	1	40	1.5	4.73	1.942	9.109
เคยดื่มน้ำหนักและเลิกมานาน	11	3.67	2	30	2	5.06	1.922	8.156
เคยดื่มน้ำหนักและเพิ่งเลิก	40	13.33	1	40	2.5	5.37	1.090	7.857
เคยดื่มน้ำหนักและเลิกมานาน	18	6.00	1	15	2	3.52	0.883	4.417
รวม	234	78.01						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 41 จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยซื้อยารักษาโรคเองแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยซื้อยารักษาโรคเอง (ครั้ง/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	59	19.67	1	12	0	1.62	0.275	3.013
ดื่มน้ำหนักในปัจจุบัน	10	3.33	1	10	1	2.35	0.818	3.372
ดื่มน้ำหนักในปัจจุบัน	24	8.00	1	20	0.5	1.65	0.510	3.459
เคยดื่มน้ำหนักและเพิ่งเลิก	7	2.33	1	20	0	2.18	1.090	5.114
เคยดื่มน้ำหนักและเลิกมานาน	4	1.33	1	5	0	0.67	0.379	1.609
เคยดื่มน้ำหนักและเพิ่งเลิก	20	6.67	1	12	0	1.50	0.414	2.987
เคยดื่มน้ำหนักและเลิกมานาน	11	3.67	1	10	0	1.36	0.556	2.782
รวม	135	45.00						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 42ก จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ครั้ง/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	27	9.00	1	2	0	0.23	0.038	0.419
ดื่มหนักในปัจจุบัน	12	4.00	1	2	1	0.76	0.136	0.562
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	25	8.33	1	2	1	0.59	0.086	0.580
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	6	2.00	1	2	0	0.32	0.121	0.568
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	4	1.33	1	1	0	0.22	0.101	0.428
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	11	3.67	1	1	0	0.21	0.057	0.412
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	3	1.00	1	1	0	0.12	0.066	0.332
รวม	88	29.33						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 43ก ค่าจ้างคนมาดูแลผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าจ้างคนมาดูแลผู้ป่วย (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	2	0.67	2,500	22,500	0	2,045	1,411	6,620
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	7,500	7,500	0	144	144	1,040
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	2	0.67	10,000	10,000	0	800	553	2,768
รวม	5	1.67						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 44ก ค่าต่อเติมส่วนต่างๆ ของบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าต่อเติมส่วนต่างๆ ของบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื่มหนักในปัจจุบัน	1	0.33	2,000	2,000	0	117	117	485
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	3	1.00	3,500	15,000	0	1,861	1,143	4,850
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	5,000	5,000	0	96	96	693
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	3	1.00	5,000	12,000	0	880	539	2,697
รวม	8	2.66						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 45ก ค่าซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	14	4.67	200	4500	0	157	66	723
ดื่มหนักในปัจจุบัน	1	0.33	4,000	4,000	0	235	235	971
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	3	1.00	520	1,200	0	48	30	203
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	2	0.67	270	1,000	0	57	46	218
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	3	1.00	150	1,000	0	88	59	252
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	9	3.00	40	6,000	0	275	146	1,057
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	3	1.00	400	4,000	0	336	221	1,105
รวม	35	11.67						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 46k ค่าอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วย (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	22	7.33	900	36,000	0	1,825	578	6,336
ดื่มหนักในปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-	-	-
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	3	1.00	200	3,000	0	95	69	472
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	360	360	0	16	16	76
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	4	1.33	1,000	12,000	0	1,555	911	3,868
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	7	2.33	1,000	64,800	0	2,226	1,377	9,930
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	1	0.33	1,000	1,000	0	40	40	200
รวม	38	12.65						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 47ก ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากปกติแยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากปกติ (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	11	3.67	100	10,000	0	155	87	957
ดื่มหนักในปัจจุบัน	1	0.33	1,000	1,000	0	58	58	242
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	4	1.33	500	2,000	0	108	61	420
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	1	0.33	500	500	0	22	22	106
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	3	1.00	200	500	0	66	38	164
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	6	2.00	200	10,000	0	340	202	1,546
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	5	1.67	2,500	5,500	0	860	370	1,851
รวม	31	10.33						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 48ก ลักษณะการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยแยกตามสภาวะการดื่มน้ำ

สภาวะการดื่มน้ำ	ประเภทการจ่ายค่ารักษาพยาบาล										รวม	
	จ่ายเอง		บัตรทอง		บัตรประกันสังคม		สิทธิข้าราชการ		อื่นๆ			
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
ไม่เคยดื่มน้ำ	10	3.33	67	22.33	8	2.67	28	9.36	7	2.33	120	40.00
ดื่มน้ำหนักในปัจจุบัน	3	1.00	1	0.33	7	2.33	4	1.33	2	0.67	17	5.67
ดื่มน้ำไม่หนักในปัจจุบัน	7	2.33	19	6.33	4	1.33	7	2.33	9	3.00	46	15.34
เคยดื่มน้ำหนักและเพิ่งเลิก	2	0.67	13	4.33	1	0.33	6	2.00	-	-	22	7.33
เคยดื่มน้ำหนักและเลิกมานาน	1	0.33	9	3.00	3	1.00	5	1.67	-	-	18	6.00
เคยดื่มน้ำไม่หนักและเพิ่งเลิก	6	2.00	30	10.00	6	2.00	8	2.67	2	0.67	52	17.33
เคยดื่มน้ำไม่หนักและเลิกนาน	3	1.00	16	5.33	-	-	3	1.00	3	1.00	25	8.33
รวม	32	10.66	155	51.65	29	9.66	61	20.36	23	7.67	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 49ก เพศของญาติผู้ป่วย

เพศของญาติผู้ป่วย	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีญาติมาด้วย	83	27.67
เพศชาย	76	25.33
เพศหญิง	141	47.00
รวม	300	100

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 50ก ค่าเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยใน ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการดื่มน้ำ

สภาวะการดื่มน้ำ	ค่าเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยใน (บาท/ปี)							
	จำนวนปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่มน้ำ	102	43.22	2,500	616,850	34,082	83,739	11,031	120,849
ดื่มน้ำหนักในปัจจุบัน	8	3.39	6,908	616,850	34,082	83,739	11,031	120,849
ดื่มน้ำไม่หนักในปัจจุบัน	23	9.75	6,908	233,616	3,454	34,511	8,395	56,938
เคยดื่มน้ำหนักและเพิ่งเลิก	19	8.05	3,800	245,000	22,547	42,264	13,409	62,896
เคยดื่มน้ำหนักและเลิกมานาน	17	7.20	1,967	362,782	51,131	106,775	28,241	119,816
เคยดื่มน้ำไม่หนักและเพิ่งเลิก	44	18.64	3,433	424,073	22,547	61,889	12,666	91,342
เคยดื่มน้ำไม่หนักและเลิกนาน	23	9.75	3,904	861,000	49,036	146,428	41,288	206,442
รวม	236	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 51 ค่าเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยนอก ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยนอก (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	104	44.44	100	37,200	0	2,136	595	5,837
ดื่มหนักในปัจจุบัน	11	4.70	200	21,540	2,150	4,957	532	6,522
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	35	14.96	200	18,000	1,800	3,081	652	4,426
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	15	6.41	300	18,240	750	2,473	893	4,189
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	11	4.70	250	15,900	350	3,136	1,323	5,615
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	40	17.10	180	15,000	920	2,582	532	3,842
เคยดื่มไม่หนักและเลิกนาน	18	7.69	200	14,500	1,700	3,774	956	4,781
รวม	234	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 52 ค่าเฉลี่ยในการซื้อยารักษาโรค ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าเฉลี่ยในการซื้อยารักษาโรค (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	59	43.70	10	12,000	0	541	178	1,953
ดื่มหนักในปัจจุบัน	10	7.41	50	1,800	120	269	106	440
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	24	17.78	40	2,000	55	236	63	428
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	7	5.19	60	5,400	0	368	248	1,167
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	4	2.96	30	200	0	32	16	70
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	20	14.81	30	1,600	0	194	55	400
เคยดื่มไม่หนักและเลิกนาน	11	8.15	10	3,000	0	185	118	594
รวม	135	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 53 ค่าเฉลี่ยสำหรับค่ารักษาจากอุบัติเหตุ ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าเฉลี่ยสำหรับค่ารักษาจากอุบัติเหตุ (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	27	30.68	50	31,105	0	1,154	355	3,894
ดื่มหนักในปัจจุบัน	12	13.64	50	64,298	1,000	11,598	4,644	19,149
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	25	28.41	20	45,630	235	3,839	1,248	8,464
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	6	6.82	2,500	31,105	0	5,336	2,250	10,556
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	4	4.54	50	350	0	33	20	8,666
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	11	12.50	60	31,751	0	1,486	744	5,365
เคยดื่มไม่หนักและเลิกนาน	3	3.41	80	500	0	26	20	101
รวม	88	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 54k ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	30	41.10	400	37,200	0	2,136	595	6,522
ดื่มหนักในปัจจุบัน	1	1.37	7,000	7,000	0	411	411	1,697
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	8	10.96	200	3,500	0	253	103	702
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	5	6.85	270	22,500	0	2,142	1,406	6,597
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	7	9.59	150	27,000	0	3,572	2,042	8,666
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	15	20.55	40	71,800	0	3,083	1,507	10,871
เคยดื่มไม่หนักและเลิกนาน	7	9.59	400	20,500	0	2,916	1,267	6,335
รวม	73	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 55k ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	120	40.00	1,300	622,850	42,089	92,530	11,086	121,449
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	1,210	362,782	31,990	66,571	27,533	113,522
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	15.34	3,400	235,416	15,675	41,922	8,315	56,401
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	4,800	278,550	30,891	52,585	13,963	65,494
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6.00	1,130	363,432	54,731	113,549	29,020	123,123
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	52	17.33	680	440,423	24,893	69,236	12,962	93,470
เคยดื่มไม่หนักและเลิกนาน	25	8.33	6,104	862,000	57,126	153,330	41,050	205,253
รวม	300	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 56k ต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดของผู้ป่วย (บาท/ปี)							
	จำนวนที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	120	40.00	50	60,050	973	3,737	761	8,345
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	200	7,608	1,550	2,175	634	2,617
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	15.34	160	21,651	1,301	2,760	635	4,308
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	35	26,285	718	3,127	1,252	5,873
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6.00	40	8,654	392	1,611	579	2,460
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	52	17.33	11	59,675	995	5,783	1,531	11,040
เคยดื่มไม่หนักและเลิกนาน	25	8.33	20	5,582	543	914	236	1,180
รวม	300	100						

ที่มา: จากการสำรวจ

ตาราง 57ก ต้นทุนส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ป่วย ในระยะเวลา 1 ปี แยกตามสภาวะการดื่ม

สภาวะการดื่ม	ต้นทุนส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ป่วย (บาท/ปี)							
	จำนวน ที่ปรากฏ	ร้อยละ	ต่ำสุด	สูงสุด	มัธยฐาน (Median)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	Standard error	Std. deviation
ไม่เคยดื่ม	120	40.00	1,327	632,806	44,487	96,267	11,296	123,747
ดื่มหนักในปัจจุบัน	17	5.67	1,220	364,670	36,259	68,746	27,569	113,670
ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน	46	15.34	724	235,516	17,373	44,683	8,527	57,834
เคยดื่มหนักและเพิ่งเลิก	22	7.33	5,433	280,877	34,776	55,712	14,665	68,785
เคยดื่มหนักและเลิกมานาน	18	6.00	1,259	363,801	56,555	115,161	28,957	122,854
เคยดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก	52	17.33	1,602	455,675	30,510	75,019	13,471	97,144
เคยดื่มไม่หนักและเลิกมานาน	25	8.33	6,648	863,501	57,205	154,244	41,104	205,521
รวม	300	100						

หมายเหตุ: Standard error คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

Std. deviation คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ที่มา: จากการสำรวจ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ภาคผนวก ข

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})

ตาราง 1x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND}) ของผู้ป่วยทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	236	3.92	5.65	4.62	13,119.31
EXP_{ND} (INPATIENT)	236	1.87	3.45	2.08	1,515.22
EXP_A (OUTPATIENT)	234	2.27	4.15	3.27	2,845.85
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	234	1.23	3.02	2.11	797.41
EXP_A (DRUG)	135	1.34	3.72	2.39	470.82
EXP_{ND} (DRUG)	135	1.02	2.56	2.14	405.30
EXP_A (ACCIDENCE)	88	1.71	4.77	3.35	1,827.72
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	88	1.03	2.14	1.87	368.20
EXP_A (OTHER)	73	2.13	4.70	3.41	933.71
EXP_{ND} (OTHER)	73	1.96	3.22	2.81	564.24

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 2x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND}) ของผู้ป่วยเพศชาย

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	158	3.92	5.65	4.60	11,435.44
EXP_{ND} (INPATIENT)	158	1.92	2.62	2.16	1,376.55
EXP_A (OUTPATIENT)	146	2.27	4.15	3.29	2,514.04
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	146	1.85	2.88	2.65	730.02
EXP_A (DRUG)	87	1.34	3.71	2.33	362.50
EXP_{ND} (DRUG)	87	1.27	2.76	2.15	309.55
EXP_A (ACCIDENCE)	62	1.71	4.64	3.28	1,401.88
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	62	1.01	1.95	1.17	298.31
EXP_A (OTHER)	43	2.13	4.71	3.45	855.20
EXP_{ND} (OTHER)	43	1.75	3.41	2.28	516.85

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 3x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยเพศหญิง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	78	4.44	5.31	4.83	1,199.28
EXP_{ND} (INPATIENT)	78	2.46	2.81	2.14	623.25
EXP_A (OUTPATIENT)	88	2.68	3.58	3.13	276.87
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	88	0.89	1.72	1.62	122.33
EXP_A (DRUG)	48	1.89	3.17	2.64	108.31
EXP_{ND} (DRUG)	48	1.38	2.99	2.92	95.74
EXP_A (ACCIDENCE)	26	2.70	4.47	3.70	351.35
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	26	2.15	3.61	2.94	144.38
EXP_A (OTHER)	30	2.43	3.55	3.14	71.52
EXP_{ND} (OTHER)	30	2.15	3.01	2.90	54.39

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 4x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	64	4.05	5.65	4.65	2,946.81
EXP_{ND} (INPATIENT)	64	2.43	3.16	2.58	434.84
EXP_A (OUTPATIENT)	64	2.62	3.74	3.27	624.13
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	64	1.94	2.77	2.64	243.66
EXP_A (DRUG)	44	2.07	3.72	2.63	171.68
EXP_{ND} (DRUG)	44	1.04	3.15	2.12	113.31
EXP_A (ACCIDENCE)	23	2.53	4.77	3.45	536.13
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	23	1.46	3.67	2.23	131.15
EXP_A (OTHER)	31	2.43	4.71	3.68	404.99
EXP_{ND} (OTHER)	31	2.11	3.65	3.47	392.33

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 5x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	172	3.92	5.31	4.61	9,865.28
EXP_{ND} (INPATIENT)	172	2.68	4.65	2.97	1,074.57
EXP_A (OUTPATIENT)	170	2.26	4.14	3.27	2,221.71
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	170	1.09	2.43	2.24	553.75
EXP_A (DRUG)	91	1.34	3.17	2.30	299.13
EXP_{ND} (DRUG)	91	1.31	2.96	2.21	291.99
EXP_A (ACCIDENCE)	65	1.71	4.69	3.30	1,291.59
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	65	1.30	2.26	1.92	237.05
EXP_A (OTHER)	42	2.13	4.21	3.22	528.71
EXP_{ND} (OTHER)	42	1.36	3.25	2.65	171.90

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 6x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคกลุ่มมะเร็ง

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	57	4.68	5.65	5.02	3,688.39
EXP_{ND} (INPATIENT)	57	3.41	4.36	4.60	2,072.23
EXP_A (OUTPATIENT)	42	2.85	3.71	3.23	440.30
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	42	1.21	2.98	2.48	156.16
EXP_A (DRUG)	20	1.34	2.81	2.41	59.56
EXP_{ND} (DRUG)	20	1.23	2.73	2.46	60.11
EXP_A (ACCIDENCE)	3	1.71	1.90	1.81	6.09
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	3	1.64	2.14	1.93	6.14
EXP_A (OTHER)	13	2.44	4.70	3.97	303.73
EXP_{ND} (OTHER)	13	2.01	3.64	2.35	201.53

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 7x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	105	4.16	5.16	4.64	4,646.43
EXP_{ND} (INPATIENT)	105	1.45	2.38	2.14	594.33
EXP_A (OUTPATIENT)	98	2.91	4.14	3.45	1,203.95
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	98	1.03	2.76	2.08	293.15
EXP_A (DRUG)	60	1.77	3.03	2.40	184.28
EXP_{ND} (DRUG)	60	1.65	2.63	2.49	128.97
EXP_A (ACCIDENCE)	24	2.20	3.53	2.70	95.29
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	24	2.18	2.92	2.48	60.29
EXP_A (OTHER)	29	2.13	4.01	3.27	252.17
EXP_{ND} (OTHER)	29	2.01	3.64	2.68	138.98

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 8x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคกลุ่มระบบย่อยอาหาร

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	39	4.05	4.63	4.33	1,848.58
EXP_{ND} (INPATIENT)	39	1.09	2.11	1.96	160.74
EXP_A (OUTPATIENT)	34	3.00	3.77	3.32	537.27
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	34	2.62	2.74	2.68	143.03
EXP_A (DRUG)	16	1.77	2.74	2.17	57.46
EXP_{ND} (DRUG)	16	1.68	2.64	2.03	54.11
EXP_A (ACCIDENCE)	6	2.13	3.08	2.54	36.07
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	6	2.41	3.01	2.43	31.09
EXP_A (OTHER)	8	3.12	4.00	3.53	125.17
EXP_{ND} (OTHER)	8	2.09	3.64	2.81	54.13

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 9x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดืมเครื่องดืมที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดืมเครื่องดืมที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคกลุ่มอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	35	3.92	4.84	4.27	863.67
EXP_{ND} (INPATIENT)	35	3.69	4.19	3.96	760.15
EXP_A (OUTPATIENT)	60	2.26	3.54	3.03	664.31
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	60	1.34	2.85	2.72	205.07
EXP_A (DRUG)	39	1.72	3.71	2.45	178.04
EXP_{ND} (DRUG)	39	1.48	2.84	2.13	153.55
EXP_A (ACCIDENCE)	55	2.53	4.77	3.67	1,716.59
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	55	1.31	1.64	1.53	244.34
EXP_A (OTHER)	23	2.32	4.04	3.19	252.64
EXP_{ND} (OTHER)	23	2.09	3.45	2.75	169.59

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 10x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดืมเครื่องดืมที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดืมเครื่องดืมที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	89	4.01	5.31	4.72	5,035.27
EXP_{ND} (INPATIENT)	89	2.36	2.91	2.83	692.65
EXP_A (OUTPATIENT)	89	2.26	3.98	3.28	1,155.83
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	89	1.26	2.45	2.31	351.07
EXP_A (DRUG)	42	1.34	3.16	2.19	122.47
EXP_{ND} (DRUG)	42	1.31	3.10	2.17	120.03
EXP_A (ACCIDENCE)	45	1.90	4.77	3.42	1,088.80
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	45	0.84	2.64	1.16	160.95
EXP_A (OTHER)	19	2.42	4.70	3.47	329.58
EXP_{ND} (OTHER)	19	2.12	2.79	2.36	135.89

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 11x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำเกลือที่มียาลดกรดจริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำเกลือที่มียาลดกรดเลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่ไม่ได้สูบบุหรี่

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	147	3.92	5.65	4.57	8,084.03
EXP_{ND} (INPATIENT)	147	1.17	2.24	2.19	822.56
EXP_A (OUTPATIENT)	145	2.62	4.15	3.25	1,690.01
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	145	1.36	2.31	2.08	446.33
EXP_A (DRUG)	93	1.77	3.71	2.48	369.85
EXP_{ND} (DRUG)	93	1.68	2.94	2.32	236.75
EXP_A (ACCIDENCE)	43	1.71	4.63	3.26	738.91
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	43	0.84	3.18	2.26	207.24
EXP_A (OTHER)	54	2.13	4.27	3.38	604.13
EXP_{ND} (OTHER)	54	1.32	2.51	2.36	428.33

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 12x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำเกลือที่มียาลดกรดจริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำเกลือที่มียาลดกรดเลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่ไม่ดื่มน้ำเกลือที่มียาลดกรด

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	102	3.92	5.65	4.62	13,119.31
EXP_{ND} (INPATIENT)	102	3.92	5.65	4.62	13,119.31
EXP_A (OUTPATIENT)	104	2.26	4.15	3.26	2,845.85
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	104	2.26	4.15	3.26	2,845.85
EXP_A (DRUG)	59	1.34	3.71	2.38	470.81
EXP_{ND} (DRUG)	59	1.34	3.71	2.38	470.81
EXP_A (ACCIDENCE)	27	1.71	4.77	3.34	1,827.72
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	27	1.71	4.77	3.34	1,827.72
EXP_A (OTHER)	30	2.13	4.71	3.41	933.71
EXP_{ND} (OTHER)	30	2.13	4.71	3.41	933.71

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 13x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำเกลือแร่ที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำเกลือแร่ที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่ดื่มหนักในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	8	4.17	5.11	4.68	644.45
EXP_{ND} (INPATIENT)	8	2.14	2.56	2.32	147.48
EXP_A (OUTPATIENT)	11	2.27	3.16	2.73	126.12
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	11	1.39	2.44	2.23	47.10
EXP_A (DRUG)	10	1.72	2.80	2.51	77.12
EXP_{ND} (DRUG)	10	1.65	2.51	2.37	50.31
EXP_A (ACCIDENCE)	12	2.53	4.77	3.63	487.05
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	12	1.32	1.86	1.77	61.07
EXP_A (OTHER)	1	3.85	4.20	3.61	43.28
EXP_{ND} (OTHER)	1	3.85	4.20	3.61	43.28

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 14x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำเกลือแร่ที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำเกลือแร่ที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่ดื่มไม่หนักในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	23	4.15	5.31	4.73	2,142.37
EXP_{ND} (INPATIENT)	23	2.31	2.98	2.65	606.19
EXP_A (OUTPATIENT)	35	2.72	3.77	3.33	792.76
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	35	1.32	2.84	2.42	195.76
EXP_A (DRUG)	24	1.90	3.16	2.44	166.16
EXP_{ND} (DRUG)	24	1.76	3.12	2.26	114.18
EXP_A (ACCIDENCE)	25	2.20	4.68	3.35	730.57
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	25	1.32	2.31	2.29	121.11
EXP_A (OTHER)	8	2.43	3.42	2.95	102.63
EXP_{ND} (OTHER)	8	1.30	2.18	2.12	36.85

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 15x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่ดื่มหนักและเพิ่งเลิกดื่ม

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	19	3.93	4.85	4.43	1,452.49
EXP_{ND} (INPATIENT)	19	2.61	2.94	2.84	129.70
EXP_A (OUTPATIENT)	15	2.80	3.55	3.25	284.70
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	15	2.25	2.81	2.69	82.76
EXP_A (DRUG)	7	1.89	3.72	2.49	54.76
EXP_{ND} (DRUG)	7	1.63	2.77	2.53	35.84
EXP_A (ACCIDENCE)	6	3.47	4.63	4.17	352.35
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	6	2.37	2.67	2.42	62.10
EXP_A (OTHER)	5	4.42	3.89	3.13	70.34
EXP_{ND} (OTHER)	5	1.39	3.16	2.81	35.12

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 16x ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่ดื่มหนักและเลิกมานาน 10 ปี

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	17	4.05	5.15	4.63	1,557.74
EXP_{ND} (INPATIENT)	17	1.73	2.32	2.14	168.25
EXP_A (OUTPATIENT)	11	2.85	3.98	3.28	193.92
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	11	2.36	3.23	2.83	112.95
EXP_A (DRUG)	4	1.89	3.71	2.49	51.16
EXP_{ND} (DRUG)	4	1.44	3.14	2.18	39.47
EXP_A (ACCIDENCE)	4	3.47	4.63	4.17	315.27
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	4	1.18	2.96	2.38	99.18
EXP_A (OTHER)	7	2.13	4.54	3.33	148.22
EXP_{ND} (OTHER)	7	2.11	3.36	2.94	121.43

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 17ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่ดื่มไม่หนักและเพิ่งเลิก

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	44	3.92	5.20	4.49	3,444.77
EXP_{ND} (INPATIENT)	44	2.48	2.86	2.50	529.01
EXP_A (OUTPATIENT)	40	2.66	3.60	3.23	822.85
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	40	1.36	2.46	2.42	188.43
EXP_A (DRUG)	20	1.79	2.93	2.41	120.80
EXP_{ND} (DRUG)	20	1.72	2.85	2.33	111.80
EXP_A (ACCIDENCE)	11	2.15	4.36	3.22	243.90
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	11	1.89	2.47	2.38	84.11
EXP_A (OTHER)	15	2.32	4.70	3.54	393.37
EXP_{ND} (OTHER)	15	2.18	2.84	2.85	212.09

ที่มา: จากการคำนวณ

ตาราง 18ข ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อผู้ป่วยมีการดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง (EXP_A) และ
 ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่คาดหมายไว้เมื่อสมมติให้ผู้ป่วยไม่ดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลย (EXP_{ND})
 ของผู้ป่วยที่ดื่มไม่หนักและเลิกมานาน 10 ปี

ค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ผลรวม
EXP_A (INPATIENT)	23	4.04	5.65	4.86	2,566.17
EXP_{ND} (INPATIENT)	23	2.46	2.81	2.74	621.48
EXP_A (OUTPATIENT)	18	3.20	4.15	3.49	465.15
EXP_{ND} (OUTPATIENT)	18	2.16	2.48	2.28	142.86
EXP_A (DRUG)	11	1.34	2.74	2.21	64.35
EXP_{ND} (DRUG)	11	1.26	2.38	2.13	43.39
EXP_A (ACCIDENCE)	3	1.90	2.46	2.16	14.25
EXP_{ND} (ACCIDENCE)	3	1.58	2.13	2.13	12.65
EXP_A (OTHER)	7	2.83	4.25	3.78	175.85
EXP_{ND} (OTHER)	7	2.45	3.65	3.56	155.03

ที่มา: จากการคำนวณ

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

หมายเลขแบบสอบถาม วันที่ สัมภาษณ์ //ผู้สัมภาษณ์

แบบสอบถาม

การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
A Study of Economic Cost of Alcohol Consumption

คำชี้แจง การวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยโดยนางสาวน้ำผึ้ง กลิ่นชู นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. เสถียร ศรีบุญเรือง เป็นประธานที่ปรึกษา รศ.ดร.คณิต เศรษฐเสถียร และผศ.นพ.สุรินทร์ จิรินรัมย์ เป็นกรรมการที่ปรึกษา การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน คือ ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

ส่วนที่1 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วย

ส่วนที่2 ประวัติการดื่มและสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย

ส่วนที่3 ค่าใช้จ่ายในการรักษาและต้นทุนที่เกิดขึ้นของผู้ป่วย

ส่วนที่4 ข้อมูลของญาติพี่น้องผู้ป่วย

ข้อมูลที่ได้จากท่านนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการวิจัยครั้งนี้มาก ผู้วิจัยถือว่าข้อมูลที่ได้เหล่านั้นเป็นความลับและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ด้วย

ส่วนที่ 1ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย

1. เพศ 1.ชาย 2.หญิง
2. อายุ ปี
3. ระดับการศึกษา

<input type="checkbox"/> 1.ไม่ได้เรียนหนังสือ	<input type="checkbox"/> 5.ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
<input type="checkbox"/> 2.ประถมศึกษา (ป.....)	<input type="checkbox"/> 6.ปริญญาโทหรือสูงกว่า
<input type="checkbox"/> 3.มัธยมศึกษา (ม...../ม.ศ.....)	<input type="checkbox"/> 7.อื่น ๆ ระบุ.....
<input type="checkbox"/> 4.อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส. ปี.....)	
4. อาชีพ (ถ้าท่านไม่ได้ทำงานกรุณาข้ามไปตอบข้อ 7.)

<input type="checkbox"/> 1.ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ระบุ.....	<input type="checkbox"/> 6.ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
<input type="checkbox"/> 2.พนักงานบริษัทเอกชน	<input type="checkbox"/> 7.เกษตรกรหรือรับจ้าง ระบุ.....
<input type="checkbox"/> 3.ผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกร	<input type="checkbox"/> 8.แม่บ้าน
<input type="checkbox"/> 4.เกษียณอายุ	<input type="checkbox"/> 9.นักเรียนหรือนักศึกษา
<input type="checkbox"/> 5.ว่างงานหรือกำลังหางาน	<input type="checkbox"/> 10.อื่น ๆ ระบุ
5. ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์ ชั่วโมง/สัปดาห์
6. รายได้ปัจจุบันของท่าน (ไม่ใช่ทั้งครัวเรือน)บาท/เดือน
7. รายได้ในปัจจุบันครัวเรือนของครอบครัวท่านบาท/เดือน
8. สถานภาพสมรส

<input type="checkbox"/> 1.โสด	<input type="checkbox"/> 3.หย่า	<input type="checkbox"/> 5.แต่งงานแล้ว
<input type="checkbox"/> 2.แยกกันอยู่	<input type="checkbox"/> 4.เป็นหม้าย	
9. จำนวนบุตรและธิดารวม.....คน
10. จำนวนสมาชิกในครอบครัว(รวมตัวท่านเอง) จำนวน.....คน

11. บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ท่านเป็นเจ้าของหรือไม่

1. ไม่ใช่

2. ใช่

12. ท่านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือไม่

1. ไม่ใช่

2. ใช่

13. ท่านนับถือศาสนาอะไร

1. พุทธ

2. คริสต์

3. อิสลาม

4. อื่น ๆ ระบุ



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ส่วนที่ 2 (ผู้วิจัยจะบันทึกเอง)

1) ประวัติและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

12. ท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่

1. ไม่เคย ให้ข้ามไปตอบข้อ 20.

2. เคย ถ้าเคยท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มานานกี่ปี.....ปี

13. ปัจจุบันท่านยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่หรือไม่

1. ไม่ดื่ม ท่านเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากี่ปีแล้ว ระบุ.....ปี

2. ดื่ม ให้ข้ามไปตอบข้อ 16.

14. สาเหตุที่ท่านเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

1. เลิกเองเพราะสุขภาพไม่ดี

4. คนในครอบครัวบอกให้เลิก

2. ได้รับรู้โทษและพิษภัย

5. อื่น ๆ ระบุ

3. หมอห้ามไม่ให้ดื่มเพราะมีผลเสียต่อสุขภาพ

15. การเลิกของท่านมีลักษณะอย่างไร

1. ค่อย ๆ เลิก

2. เลิกเลยทีเดียว

3. อื่น ๆ ระบุ

16. จำนวนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ดื่ม(หน่วยสุรา)

1. กรณีที่เคยดื่มแต่เลิกแล้ว

2. กรณีที่กำลังดื่มในปัจจุบัน

ชนิด

เฉลี่ยต่อวัน (หน่วยสุรา/วัน)

มากที่สุดต่อวัน (หน่วยสุรา/วัน)

1. สุรา

2. เบียร์

3. ไวน์

4. อื่น ๆ ระบุ

หมายเหตุ: 1 หน่วยสุรา(Units) คือ เบียร์ 360 ซีซี ไวน์คือ 150 ซีซี สุราคือ 45 ซีซี

17. ช่วงเวลาที่ท่านเคยหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากที่สุด
(ให้ระบุตัวเลขที่ตรงกับตัวท่านที่สุดหน้าข้อความ โดย 1 = มากที่สุด 2 = ปานกลาง 3 = เล็กน้อย และ 4 = น้อยที่สุด)

- 1.ระหว่างรับประทานอาหาร 4.หลังเลิกงาน
 2.เทศกาลและวันหยุด 5.สิ้นเดือน
 3.เวลาเข้าสังคม 6.อื่น ๆ ระบุ

18. ช่วงเวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากที่สุดนั้นเป็นเพราะสาเหตุใดมากที่สุด
(ให้ระบุตัวเลขที่ตรงกับตัวท่านที่สุดหน้าข้อความ โดย 1 = มากที่สุด 2 = ปานกลาง 3 = เล็กน้อย และ 4 = น้อยที่สุด)

- 1.ดื่มเพื่อคลายความเครียด 3.ดื่มเวลาสังสรรค์เข้าสังคม
 2.ดื่มเพื่อดับทุกข์ลัดกลุ้มใจและผิดหวัง 4.อื่น ๆ ระบุ

19. ท่านคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเป็นอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่

- 1.ไม่เกี่ยว 2.เกี่ยว 3.ไม่ทราบ

2) ภาวะสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

20. ท่านมีส่วนสูง เซนติเมตร น้ำหนัก กิโลกรัม

21. ท่านได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์โรงพยาบาลว่าเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่

(ในกรณีที่เป็นโรคมะเร็งโปรดระบุระยะของโรค โดย 1 = ระยะที่ 1 2 = ระยะที่ 2 3 = ระยะที่ 3 และ 4 = ระยะที่ 4 โดยให้ทำเครื่องหมาย หน้าตัวเลขที่ตรงกับตัวท่านที่สุด)

21.1 กลุ่มโรคมะเร็ง(Malignant Neoplasm) ได้แก่

1) มะเร็งเต้านม(Breast Cancer)

- 1.ระยะที่ 1 2.ระยะที่ 2 3.ระยะที่ 3 4.ระยะที่ 4

2) มะเร็งลำไส้ใหญ่(Colorectal Cancer)

- 1.ระยะที่ 1 2.ระยะที่ 2 3.ระยะที่ 3 4.ระยะที่ 4

3) มะเร็งตับ(Liver Cancer)

- 1.ระยะที่ 1 2.ระยะที่ 2 3.ระยะที่ 3 4.ระยะที่ 4

4) มะเร็งคอหอย(Oral/Pharyngeal Cancer)

1.ระยะที่ 1 2.ระยะที่ 2 3.ระยะที่ 3 4.ระยะที่ 4

5) มะเร็งในปากและช่องปาก(Oropharyngeal cancer)

1.ระยะที่ 1 2.ระยะที่ 2 3.ระยะที่ 3 4.ระยะที่ 4

6) มะเร็งหลอดอาหาร (Oesophageal cancer)

1.ระยะที่ 1 2.ระยะที่ 2 3.ระยะที่ 3 4.ระยะที่ 4

7) มะเร็งกระเพาะอาหาร(Stomach cancer)

1.ระยะที่ 1 2.ระยะที่ 2 3.ระยะที่ 3 4.ระยะที่ 4

8) มะเร็งรังไข่(Ovarian cancer)

1.ระยะที่ 1 2.ระยะที่ 2 3.ระยะที่ 3 4.ระยะที่ 4

21.2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด(Cardiovascular Disease)

1) โรคหัวใจ(Cardiomypopathy)

2) โรคความดันโลหิตสูง(Hypertensive disease)

3) โรคหัวใจทำงานบกพร่อง(Cardio vascular defects)

4) โรคหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ(Cardiac arrhythmias)

5) โรคหัวใจล้มเหลว(Heart failure)

6) โรคหัวใจอื่นๆ(Other heart disease)

21.3 กลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร(Digestive System)

1) โรคตับแข็ง(Cirrhosis)

2) โรคแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น(Duodenal Ulcers)

3) โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน(Pancreatitis / Acute)

4) โรคตับอ่อนอักเสบแบบเรื้อรัง(Chronic Pancreatic)

5) โรคกระเพาะ(Stomach ulcers)

- 6) โรคตับมัน(Fatty Liver)
- 7) โรคตับอักเสบ(Infected Hepatitis)
- 8) โรคเบาหวาน

21.4 กลุ่มโรคอื่นๆ (Other)

- 1) ไฟไหม้(Burns)
- 2) โรคจิตเสื่อม(Dementia)
- 3) โรคลมบ้าหมู(Epilepsy)
- 4) โรคลมชัก(Seizures)
- 5) โรควัณโรค(Tuberculosis)
- 6) โรคความจำเสื่อม(Korsakoff's Syndrome)
- 7) โรควิกลจริต(Alcoholic Dementia)
- 8) โรคนอนไม่หลับ(Insomnia)
- 9) โรคสมองพิการ(Ataxia due to Cerebella Dysfunction)
- 10) โรคซึมเศร้า(Depression)
- 11) กล้ามเนื้อส่วนปลายแขน ขา อ่อนแรง / ปลายประสาทพิการ(Alcoholic Peripheral Myopathy)
- 12) โรคพิษสุราเรื้อรัง(Alcohol-dependence syndrome)
- 13) กลุ่มโรคความผิดปกติของเด็กในครรภ์ที่มารดาดื่มแอลกอฮอล์ (Fetal Alcohol Syndrome)
- 14) โรคปอดปวม(Pneumonia)
- 15) โรคเกาต์(Gout)
- 16) อุบัติเหตุและการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ(Unintentional injuries)

22. ท่านออกกำลังกายเป็นประจำหรือไม่

1. ไม่ใช่

2.ใช่ จำนวนชั่วโมง / สัปดาห์

23. ท่านสวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นประจำหรือไม่

1. ไม่ใช่

2.ใช่

24. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่

1. ไม่สูบ

2.สูบ

ถ้าสูบ กรุณาระบุจำนวนที่สูบซอง / สัปดาห์

3) ลักษณะการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

25. ในปีที่ผ่านมาท่านต้องพักอยู่ที่บ้านเพราะการเจ็บป่วยหรือไม่

1. ไม่ใช่ ให้ข้ามไปตอบข้อ 28

2.ใช่

26. ถ้าต้องพักรักษาตัว ท่านต้องนอนอยู่บนเตียงใช่หรือไม่

1. ไม่ใช่ ให้ข้ามไปตอบข้อ 27

2.ใช่

27. ถ้าใช่ จำนวนกี่วันท่านต้องนอนพักอยู่บนเตียง ในช่วง 1 ปี

28. และเป็นจำนวนกี่วันที่ท่านต้องพักอยู่ที่บ้าน วันในช่วง 1 ปี

29. ปกติแล้วท่านได้รับการดูแลรักษาสุขภาพจากสถานที่ใดต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลของรัฐ

4.สถานีนอนามัย

2.โรงพยาบาลเอกชน

5.สถานพยาบาลสังกัดหน่วยงานของท่าน

3.คลินิก

6.อื่น ๆ ระบุ

30. ปกติแล้ว ท่านได้รับการดูแลรักษาและได้รับบริการพยาบาลจากใคร

1.แพทย์

4.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2.พยาบาล

5.อื่น ๆ ระบุ

3.นักกายภาพบำบัด

ส่วนที่ 3

1) ค่าใช้จ่าย: ต้นทุนทางตรง

31. ช่วงปีที่ผ่านมาท่านเข้ามารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในโดยต้องนอนโรงพยาบาลใช่หรือไม่

1. ไม่ใช่

2. ใช่

ถ้าใช่ กรุณากรอกรายละเอียดในตาราง

ครั้งที่	โรงพยาบาลของรัฐหรือของเอกชน	จำนวนวันที่พักรักษา (วัน)	ระยะทางจากบ้านมายังโรงพยาบาล (กม.)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บาท)	เวลาที่ท่านรอรับการรักษ (ชั่วโมง)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ดูแลระหว่างอยู่โรงพยาบาล		ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวม (บาท)
						จำนวนญาติ (คน/วัน)	ค่าจ้างคนมาดูแล (บาท/วัน)	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

32. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านได้มาทำการรักษาหรือผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยนอกหรือไม่

1. ไม่ใช่

2. ใช่

ถ้าใช่ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร เมื่อต้องมารับการรักษาที่แพทย์ รักษาที่คลินิก หรือมาโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก กรุณากรอกรายละเอียด

ครั้งที่	สถานพยาบาล	ระยะทางจากบ้านท่านมายังสถานพยาบาล (กม.)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บาท)	เวลาที่ท่านรอรับการรักษา (ชั่วโมง)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ดูแลระหว่างมาสถานพยาบาล		ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวม (บาท)
					จำนวนญาติ (คน/วัน)	ค่าจ้างคนมาดูแล (บาท/วัน)	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

33. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแล้วท่านเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อรักษาโรคกี่ครั้ง แต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินเท่าไร

1. ไม่มี

2. มี

ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 5 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 2 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 6 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 3 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 7 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 4 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 8 ค่าใช้จ่าย.....บาท

รวมทุกครั้งประมาณ.....บาท/ปี

34. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแล้วท่านเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจากอุบัติเหตุกี่ครั้ง แต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินเท่าไร

1. ไม่มี

2. มี

ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 5 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 2 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 6 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 3 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 7 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 4 ค่าใช้จ่าย.....บาท

ครั้งที่ 8 ค่าใช้จ่าย.....บาท

รวมทุกครั้งประมาณ.....บาท/ปี

35. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยหรือไม่ (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ซื้อรถเข็น ต่อเติมห้องนอน บันได บ้าน ซ่อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ)

1. ไม่มี

2. มี

ถ้ามี กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อความของรายการที่เกิดขึ้นพร้อมระบุจำนวนเงิน

โดยประมาณ

1. จ้างคนดูแล (Caregivers) มาช่วยดูแลรักษาที่บ้าน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี

2. ค่าต่อเติมบ้าน ห้องนอน หรือส่วนต่างๆ ของบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี

3. ซ่อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถเข็น ไม้ค้ำยัน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี

4. อาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วย เช่น อาหารเหลว อาหารเสริม วิตามิน เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี
5. อื่นๆ เช่น ค่าสาธารณสุขปกศ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย.....บาท/ปี
36. ท่านจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีใด
- 1.จ่ายเอง
- 2.บัตรประกันสุขภาพของรัฐบาล
- 3.บัตรประกันสังคม
- 4.ใช้สิทธิข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- 5.อื่น ๆ ระบุ

2)สถานะการทำงาน: ต้นทุนทางอ้อม

37. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยขาดงานเพราะปัญหาสุขภาพหรือไม่
- 1.ไม่เคย 2.เคย
ถ้าเคย จำนวนวันทั้งหมด คือวัน
38. ช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีวันที่ไม่สามารถทำงานประจำได้เพราะปัญหาสุขภาพหรือไม่
- 1.ไม่เคย 2.เคย
ถ้ามี จำนวนวันทั้งหมด คือวัน
39. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านต้องหยุดทำงานเป็นช่วงเวลานานเพราะปัญหาสุขภาพหรือไม่
- 1.ไม่เคย 2.เคย
ถ้าเคย จำนวนระยะเวลาทั้งหมด คือ เดือนวัน
40. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยเปลี่ยนชั่วโมงการทำงาน เพราะปัญหาสุขภาพหรือไม่
- 1.ไม่เคย 2.เคย
ถ้าเคย โปรดระบุจำนวน ครั้ง
และแต่ละครั้งต้องลดชั่วโมงทำงานลง ชั่วโมง

41. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านเสียเวลาเพื่อไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไม่

- 1.ไม่เคย 2.เคย

ถ้าเคย จำนวนชั่วโมงที่คุณเสียไป ชั่วโมง/ปี

ส่วนที่ 4

แบบสอบถามสำหรับญาติผู้ป่วย

42. เพศ 1.ชาย 2.หญิง

43. อายุปี

44. อาชีพ

- 1.ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ระบุ..... 6.ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 2.พนักงานบริษัทเอกชน 7.เกษตรกรหรือรับจ้าง ระบุ.....
 3.ผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกร 8.แม่บ้าน
 4.เกษียณอายุ 9.นักเรียนหรือนักศึกษา
 5.ว่างงานหรือกำลังหางาน 10.อื่น ๆ ระบุ

45. รายได้ของท่านประมาณ.....บาท/เดือน

46. ท่านใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งประมาณชั่วโมง.....นาที

47. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย บาท/ครั้ง

(ถ้าท่านไม่สามารถประมาณได้ โปรดระบุค่าใช้จ่ายครั้งล่าสุด)

48. ท่านเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยทุกครั้งหรือไม่ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา

- 1.ทุกครั้ง จำนวนครั้ง 2.บางครั้ง จำนวนครั้ง

ข้อ 49 และ 50 สำหรับญาติผู้ป่วยนอก

49. ท่านต้องเสียเวลารอคอยเมื่อผู้ป่วย(ญาติของท่าน) รับการตรวจ/รักษา ในแต่ละครั้งนาน
 ประมาณชั่วโมง.....นาที(ถ้าท่านไม่สามารถประมาณได้ โปรดระบุค่าใช้จ่ายครั้งล่าสุด)

50. ท่านต้อง ลางาน หรือขาดงาน ในการพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทั้งวันหรือไม่

- 1.ไม่ใช่ โดยลาหรือหยุดงานชั่วโมงนาที

2.ใช่

3.ไม่ได้ลาหรือหยุดงาน เพราะไม่ได้ทำงาน

ข้อ 51 สำหรับญาติผู้ป่วยใน

51. ในช่วงที่ท่านดูแลผู้ป่วยท่านต้องขาดงานเฉลี่ยประมาณครั้งละวัน
(ถ้าท่านไม่สามารถประมาณได้ โปรดระบุค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย)

ขอขอบพระคุณที่ช่วยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นางสาวน้ำผึ้ง กลิ่นชู
วัน เดือน ปี เกิด	1 กุมภาพันธ์ 2526
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2543 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2547
ประสบการณ์ 2548 – ปัจจุบัน	ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบริษัท ซาโพรี อิตาลีเยนิ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved