

0/000
6/3-9/4
8/12-21

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับ บริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่ จำนวน 100 คน คือหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-44 ปีกำลังอยู่กับสามีและมีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน กลุ่มแรกมารับบริการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราว และกลุ่มที่สองมารับบริการคุมกำเนิดชนิดถาวร ผลการศึกษานำเสนอโดยแบ่งเป็น 6 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ และสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการแต่งงาน ลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสามี และประวัติเกี่ยวกับบุตร และความต้องการบุตรเพิ่ม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องผลของการคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวรของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการคุมกำเนิด เหตุผลที่เลือกใช้วิธีคุมกำเนิด ผู้แนะนำให้ใช้วิธีคุมกำเนิด และอาการแทรกซ้อนจากการคุมกำเนิดของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ได้แก่ วิธีคุมกำเนิด ความหมาย ประโยชน์ การปฏิบัติ และอาการข้างเคียงของการคุมกำเนิดของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ เพศของบุตรที่มีชีวิตอยู่ การปรึกษากับสามี เรื่องการคุมกำเนิด ความเชื่อในเรื่องผลของการคุมกำเนิด และเหตุผลในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดกับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวรของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องการคุมกำเนิดกับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวรของกลุ่มตัวอย่าง

เลขหมู่
เลขทะเบียน	118507

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้และสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
อายุ(ปี)		
20-24	7	7.0
25-29	21	21.0
30-34	41	41.0
35-39	30	30.0
40-44	1	1.0
โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างอายุ 31 ปี S.D. = 4.5		
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	3	3.0
ประถมศึกษา	76	76.0
มัธยมศึกษา	8	8.0
ประกาศนียบัตร, อนุปริญญา	9	9.0
ปริญญาตรี	4	4.0

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
ศาสนา		
พุทธ	95	95.0
คริสต์	5	5.0
อาชีพ		
รับจ้าง	39	39.0
แม่บ้าน	29	29.0
เกษตรกร	17	17.0
ข้าราชการ	8	8.0
ค้าขาย	5	5.0
ลูกจ้างประจำ	2	2.0
รายได้		
< 3,000 บาท	50	50.0
3,001 - 5,000 บาท	12	12.0
5,001 - 7,000 บาท	20	20.0
7,001 บาทขึ้นไป	18	18.0
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 5,832 บาท/เดือน		
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง		
แข็งแรง	95	95.0
ไม่แข็งแรง	5	5.0

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กับสามีและมีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มารับบริการคุมกำเนิดทั้งชนิดชั่วคราวและถาวรจำนวน 100 คน อายุเฉลี่ยเท่ากับ 31 ปี กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 41 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 35-39 ปีร้อยละ 30 ช่วงอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 21 และช่วงอายุอื่น ๆ ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 76 รองลงมาได้แก่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ร้อยละ 9 ซึ่งมีอัตราใกล้เคียงกับระดับมัธยมศึกษาคือร้อยละ 8 ที่เหลือร้อยละ 4 ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เกือบทั้งหมดร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่นับถือศาสนาคริสต์ มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด ร้อยละ 39 เป็นแม่บ้านร้อยละ 29 เกษตรกรรมร้อยละ 17 รับราชการร้อยละ 8 และอาชีพอื่น ๆ ตามลำดับ รายได้ต่อเดือน เฉลี่ยเท่ากับ 5,832 บาท มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ร้อยละ 50 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 3,001 - 5,000 บาท ร้อยละ 12 และช่วงอื่น ๆ ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ตอบว่าสุขภาพไม่แข็งแรง โดยให้ข้อมูลว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง คอพอก ริดสีดวงทวาร และโรคเบาหวาน เป็นต้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการแต่งงาน ลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทั่วไปของสามี ประวัติเกี่ยวกับบุตร และความต้องการบุตรเพิ่ม

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประวัติการแต่งงาน ลักษณะครอบครัว และข้อมูลทั่วไปของสามี

ประวัติการแต่งงาน ลักษณะครอบครัว และข้อมูลทั่วไปของสามี	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
อายุที่แต่งงานครั้งแรก(ปี)		
< 20	35	35.0
20-24	36	36.0
25-29	28	28.0
30-34	1	1.0
อายุเฉลี่ยที่แต่งงานครั้งแรก 22 ปี S.D. 3.6		
การแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันเป็นการแต่งงานครั้งแรก		
ใช่	91	91.0
ไม่ใช่	9	9.0
ลักษณะของครอบครัว		
ครอบครัวเดี่ยว	86	86.0
ครอบครัวขยาย	14	14.0

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประวัติการแต่งงาน ลักษณะครอบครัว และข้อมูลทั่วไปของสามี(ต่อ)

ประวัติการแต่งงาน ลักษณะครอบครัว และข้อมูลทั่วไปของสามี	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
อายุของสามีคนปัจจุบัน(ปี)		
20-24	2	2.0
25-29	14	14.0
30-34	37	37.0
35-39	37	37.0
40-44	6	6.0
45 ปีขึ้นไป	4	4.0
อายุเฉลี่ยของสามี 34 ปี S.D. = 4.9		
อาชีพของสามี		
รับจ้าง	64	64.0
เกษตรกร	20	20.0
ข้าราชการ	6	6.0
อื่น ๆ	10	10.0
สุขภาพของสามี		
แข็งแรง	96	96.0
ไม่แข็งแรง	4	4.0

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประวัติการแต่งงาน ลักษณะครอบครัว และข้อมูลทั่วไปของสามี(ต่อ)

ประวัติการแต่งงาน ลักษณะครอบครัว และข้อมูลทั่วไปของสามี	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
การปรึกษากับสามีในเรื่องการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		
เคยปรึกษา	80	80.0
ไม่เคยปรึกษา	20	20.0

จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยที่แต่งงานครั้งแรกคือ 22 ปี ช่วงอายุในการแต่งงานครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีร้อยละ ใกล้เคียงกันถึง 3 ช่วง ได้แก่อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 35 อายุ 20-24 ปี ร้อยละ 36. อายุ 25-29 ปี ร้อยละ 28 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่แต่งงานครั้งแรกในช่วงอายุ 30-34 ปี เกือบทั้งหมดร้อยละ 91. ที่แต่งงานกับสามีคนปัจจุบันเป็นการแต่งงานครั้งแรก มีเพียงร้อยละ 9. เท่านั้นที่ตอบว่าไม่ใช่ลักษณะครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 86 เป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงร้อยละ 14. เท่านั้นที่เป็นครอบครัวขยาย อายุเฉลี่ยของสามีคนปัจจุบันคือ 34 ปีและอยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปี 35-39 ปี เท่ากันคือร้อยละ 37 รองลงมาได้แก่อายุ 25-29 ปี ร้อยละ 14 และช่วงอายุอื่น ๆ ตามลำดับ อาชีพของสามีส่วนใหญ่ร้อยละ 64. และมีอาชีพรับจ้าง รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร ร้อยละ 20 อาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย ร้อยละ 10. และมีเพียงร้อยละ 6. เท่านั้นที่สามีรับราชการ สามีมีสุขภาพแข็งแรงถึงร้อยละ 96. มีเพียงร้อยละ 4. เท่านั้นที่สามีสุขภาพไม่แข็งแรง โดยพบว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 80. เคยปรึกษากับสามีเรื่องการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดมีเพียงร้อยละ 20 ที่ตัดสินใจเอง

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประวัติเกี่ยวกับบุตร

ประวัติเกี่ยวกับบุตร	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่		
2 คน	91	91.0
2 คนขึ้นไป	9	9.0
เพศของบุตรที่มีชีวิตอยู่		
มีเพศเดียว	48	48.0
มีทั้งสองเพศ	52	52.0
สุขภาพของบุตรทุกคน		
แข็งแรงทุกคน	98	98.0
ไม่ค่อยแข็งแรง	2	2.0
สามีคนปัจจุบันต้องการบุตรเพิ่ม		
เพิ่ม	17	17.0
ไม่เพิ่ม	83	83.0
ตัวเองต้องการบุตรเพิ่ม		
เพิ่ม	7	7.0
ไม่เพิ่ม	93	93.0

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91 มีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 2 คน มีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่มีจำนวนบุตรมากกว่า 2 คนขึ้นไป ส่วนเพศของบุตรนั้นพบว่า มีบุตรครบทั้งเพศชายและหญิงมีร้อยละ 52 ซึ่งมีอัตราใกล้เคียงกับผู้ที่มิบุตรเพศเดียวซึ่งมีร้อยละ 48 เกือบทั้งหมดร้อยละ 98 มีบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง มีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่มีบุตรไม่คอยแข็งแรง เจ็บป่วยเล็กน้อย คือมีอาการปวดท้องเป็นประจำทั้ง 2 คน ความต้องการบุตรเพิ่มของสามีและกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกัน กล่าวคือ สามีไม่ต้องการมีบุตรเพิ่มร้อยละ 83 ต้องการบุตรเพิ่มเพียงร้อยละ 17 และกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการมีบุตรเพิ่มร้อยละ 93 ต้องการบุตรเพิ่มเพียงร้อยละ 7

ตาราง 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความต้องการของสามีในการมีบุตรเพิ่ม

ความต้องการของสามี ในการมีบุตรเพิ่ม	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
ต้องการ	17 (17.0%)	0 (0%)	17 (17.0%)
ไม่ต้องการ	33 (33.0%)	50 (50.0%)	83 (83.0%)
รวม	50 (50.0%)	50 (50.0%)	100 (100.0%)

จากตาราง 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวร้อยละ 33 สามีไม่ต้องการบุตรเพิ่ม มีเพียงร้อยละ 17 เท่านั้นที่สามีต้องการบุตรเพิ่มอีก ในกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดชนิดถาวรพบว่า สามีไม่มีความต้องการบุตรเพิ่มถึงร้อยละ 50

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องผลของการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและชนิดถาวร

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความเชื่อในเรื่องผลของการคุมกำเนิด

ความเชื่อในเรื่องผลของการคุมกำเนิด	เชื่อ	ไม่เชื่อ	รวม
การกินยาเม็ดคุมกำเนิดทำให้มดลูกแห้ง	44 (44.0%)	56 (56.0%)	100
การกินยาเม็ดคุมกำเนิดทำให้ความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้น	18 (18.0%)	82 (82.0%)	100
การกินยาเม็ดคุมกำเนิดทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง	19 (19.0%)	81 (81.0%)	100
การกินยาเม็ดคุมกำเนิดทำให้พอม	35 (35.0%)	65 (65.0%)	100
การฉีดยาคุมกำเนิดทำให้ปวดเมื่อยแขนขา	15 (15.0%)	85 (85.0%)	100
การฉีดยาคุมกำเนิดทำให้ความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้น	6 (6.0%)	94 (94.0%)	100
การฉีดยาคุมกำเนิดทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง	17 (17.0%)	83 (83.0%)	100
การฉีดยาคุมกำเนิดทำให้พอม	32 (32.0%)	68 (68.0%)	100
การใส่ห่วงอนามัยทำให้หน้าดำได้	4 (4.0%)	96 (96.0%)	100
การใส่ห่วงอนามัยทำให้ทำงานหนักไม่ได้	31 (31.0%)	69 (69.0%)	100
การใส่ห่วงอนามัยถ้าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นอาจทำให้ลูกพิการ	28 (28.0%)	72 (72.0%)	100
การใส่ห่วงอนามัยอาจทำให้เป็นมะเร็ง	26 (26.0%)	74 (74.0%)	100

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความเชื่อในเรื่องผลของการคุมกำเนิด (ต่อ)

ความเชื่อในเรื่องผลของการคุมกำเนิด	เชื่อ	ไม่เชื่อ	รวม
การใส่ห่วงอนามัยทำให้ประจำเดือนออก ตลอดเวลา	33 (33.0%)	67 (67.0%)	100
การทำหมันทำให้ทำงานหนักไม่ได้ตลอดไป	32 (32.0%)	68 (68.0%)	100
การทำหมันทำให้สามีไม่ไวใจภรรยากลัวว่า จะนอกใจได้ง่าย	26 (26.0%)	74 (74.0%)	100
การทำหมันทำให้ความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้น	26 (26.0%)	74 (74.0%)	100
การทำหมันทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง	7 (7.0%)	93 (93.0%)	100
การทำหมันทำให้อ้วนได้ง่าย	54 (54.0%)	46 (46.0%)	100

จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการคุมกำเนิดได้แก่ เชื่อว่าการทำหมันทำให้มดลูกแห้ง ร้อยละ 44 รองลงมาเชื่อว่ากินยาเม็ดคุมกำเนิดทำให้ผอม ร้อยละ 35 ยาลดคุมกำเนิดทำให้ผอม ร้อยละ 32 ส่วนการใส่ห่วงอนามัยทำให้ประจำเดือนออกตลอดเวลา ร้อยละ 33 และเชื่อว่าการทำหมันหญิงทำให้อ้วนง่ายถึงร้อยละ 54 โดยสรุปกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยที่มีความเชื่อ ไม่ถูกต้อง เกือบครึ่งและส่วนใหญ่ที่เชื่อถูกต้อง

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการคุมกำเนิด เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิด ผู้แนะนำให้ใช้วิธีการคุมกำเนิด และอาการแทรกซ้อนจากการคุมกำเนิดของกลุ่มตัวอย่าง

ตาราง 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้และวิธีการคุมกำเนิด

ระยะเวลาที่ใช้	วิธีการคุมกำเนิด		รวม
	ชั่วคราว	ถาวร	
ต่ำกว่า 1 ปี	13 (13.0%)	42 (42.0%)	55 (55.0%)
1- 5 ปี	34 (34.0%)	3 (3.0%)	37 (37.0%)
6-10 ปี	3 (3.0%)	2 (2.0%)	5 (5.0%)
11-15 ปี	-	3 (3.0%)	3 (3.0%)
รวม	50 (50.0%)	50 (50.0%)	100 (100.0%)

จากตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการคุมกำเนิดทั้งชนิดชั่วคราวและถาวรในระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี มีจำนวนมากที่สุดคือ ร้อยละ 55 รองลงมาคือใช้ในระยะเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 37 เมื่อแยกตามวิธีการคุมกำเนิด ในการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวพบว่า กลุ่มที่ใช้ระยะเวลา 1-5 ปี มีจำนวนสูงสุดคือ ร้อยละ 34 ในขณะที่วิธีการคุมกำเนิดชนิดถาวรใช้ในระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปีเป็นจำนวนสูงที่สุดถึง ร้อยละ 42.

ตาราง 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิด
ชนิดต่างๆ

เหตุผลในการเลือกใช้ วิธีการคุมกำเนิด	วิธีการคุมกำเนิด				รวม
	ยาเม็ด	ยาฉีด	ห่วงอนามัย	หมั้นหญิง	
สะดวกดี	14(14.0%)	11(11.0%)	8(8.0%)	-	33(33.0%)
ไม่ต้องการบุตรเพิ่ม	2(2.0%)	-	2(2.0%)	27(27.0%)	31(31.0%)
ยากจน	-	-	-	12(12.0%)	12(12.0%)
ไม่มีเงินพอใช้จ่าย	-	-	-	4(4.0%)	4(4.0%)
ไม่มีออร์โมน	-	-	4(4.0%)	-	4(4.0%)
ไม่มีคนช่วยเลี้ยงเด็ก	-	1(1.0%)	-	2(2.0%)	3(3.0%)
ต้องการบุตรเพิ่ม	-	2(2.0%)	1(1.0%)	-	3(3.0%)
ไม่ต้องการกินยาเม็ด	-	2(2.0%)	-	1(1.0%)	3(3.0%)
เป็นโรคเบาหวาน	-	-	-	3(3.0%)	3(3.0%)
ไม่เจ็บปวด	1(1.0%)	-	1(1.0%)	-	2(2.0%)
คลอดบุตรยาก	-	-	-	1(1.0%)	1(1.0%)
ไม่แพ้	-	1(1.0%)	-	-	1(1.0%)
รวม	17(17.0%)	17(17.0%)	16(16.0%)	50(50.0%)	100(100.0%)

จากตาราง 7 เหตุผลในการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความสะดวกมากที่สุดคือ ร้อยละ 33. รองลงมาคือไม่ต้องการบุตรเพิ่มร้อยละ 31. ยากจน ร้อยละ 12. และเหตุผลอื่น ๆ ตามลำดับ เมื่อแยกตามวิธีคุมกำเนิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวจะให้เหตุผลว่าสะดวกมากที่สุดร้อยละ 33 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดถาวร ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการบุตรเพิ่มร้อยละ 27

ตาราง 8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามผู้แนะนำและวิธีการคุมกำเนิดที่เลือกใช้

ผู้แนะนำ	วิธีการคุมกำเนิดที่เลือกใช้		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
แพทย์	3 (3.0%)	3 (3.0%)	6 (6.0%)
พยาบาล	23 (23.0%)	24 (24.0%)	47 (47.0%)
ตัดสินใจเอง	17 (17.0%)	14 (14.0%)	31 (31.0%)
ญาติ เพื่อน	3 (3.0%)	4 (4.0%)	7 (7.0%)
สามี	4 (4.0%)	5 (5.0%)	9 (9.0%)
รวม	50 (50.0%)	50 (50.0%)	100 (100.0%)

จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวได้รับการแนะนำจากพยาบาลมากที่สุดร้อยละ 23 รองลงมาคือตัดสินใจเองร้อยละ 17 กลุ่มที่ใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดถาวรก็ได้รับการแนะนำจากพยาบาลมากที่สุดคือ ร้อยละ 24 เช่นกัน รองลงมาคือ ร้อยละ 14 ตัดสินใจเองและอื่นๆ ตามลำดับ

ตาราง 9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และวิธีการ
คุมกำเนิดที่เลือกใช้

อาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น	วิธีการคุมกำเนิดที่เลือกใช้				รวม
	ยาเม็ด	ยาฉีด	ห่วงอนามัย	หมันหญิง	
ไม่มีอาการ	16 (16.0%)	17 (17.0%)	16 (16.0%)	50 (50.0%)	99 (99.0%)
มีอาการ	1 (1.0%)	-	-	-	1 (1.0%)
รวม	17 (17.0%)	17 (17.0%)	16 (16.0%)	50 (50.0%)	100 (100.0%)

จากตาราง 9 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 99 ไม่พบว่ามีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นในขณะที่
ใช้วิธีคุมกำเนิดทั้งชนิดชั่วคราวและถาวร มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่มีอาการแทรกซ้อนขณะใช้
ยาเม็ดคุมกำเนิด คือมีอาการปวดศีรษะ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องการคุมกำเนิดได้แก่วิธีคุมกำเนิด ความหมาย ประโยชน์ การปฏิบัติ และอาการข้างเคียงของการคุมกำเนิด

ตาราง 10 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้เรื่องชนิดของวิธีการคุมกำเนิด

ความรู้เรื่องชนิดของวิธีการคุมกำเนิด	ใช่	ไม่ใช่	รวม
1. ชนิดชั่วคราว			
- ยาเม็ดคุมกำเนิด	92 (92.0%)	8 (8.0%)	100
- ยาฉีดคุมกำเนิด	89 (89.0%)	11 (11.0%)	100
- ห่วงอนามัย	77 (77.0%)	23 (23.0%)	100
- ยาฝังคุมกำเนิด	45 (45.0%)	55 (55.0%)	100
- ถุงยางอนามัย	84 (84.0%)	16 (16.0%)	100
- นีบระยะปลอดภ้ย	35 (35.0%)	65 (65.0%)	100
2. ชนิดถาวร			
- ทำหมันหญิง	91 (91.0%)	9 (9.0%)	100
- ทำหมันชาย	83 (83.0%)	17 (17.0%)	100

จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด คือ ร้อยละ 92 รองลงมาคือทำหมันหญิง ร้อยละ 91 และยาฉีดคุมกำเนิด ร้อยละ 89 ชนิดอื่นๆ ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 35 เท่านั้นที่มีความรู้เกี่ยวกับนีบระยะปลอดภ้ย

ตาราง 11 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้เรื่องความหมายและประโยชน์ของการคุมกำเนิด

ความรู้เรื่องความหมาย และประโยชน์ของการคุมกำเนิด	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
ความหมายของวิธีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราว		
การป้องกันไม่ให้มีบุตรระยะหนึ่ง เมื่อ เลิกใช้แล้วสามารถมีบุตรได้อีก	67	67.0
การป้องกันไม่ให้สามารถมีบุตรได้อีก	6	6.0
การกินยาเม็ดคุมกำเนิด	25	25.0
ไม่ทราบ	2	2.0
ความหมายของวิธีการคุมกำเนิดชนิดถาวร		
การป้องกันไม่ให้มีบุตรระยะหนึ่ง เมื่อเลิกใช้แล้ว สามารถมีบุตรได้อีก	4	4.0
ไม่สามารถมีบุตรได้อีก	54	54.0
การทำหมัน	40	40.0
ไม่ทราบ	2	2.0
ประโยชน์ของการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราว		
ไม่ยุ่งยากสะดวกดี	27	27.0
เสียค่าใช้จ่ายน้อย	7	7.0
มีบุตรได้เมื่อมีความพร้อมของครอบครัว	64	64.0
ไม่ทราบ	2	2.0

ตาราง 11 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้เรื่องความหมายและประโยชน์ของการคุมกำเนิด (ต่อ)

ความรู้เรื่องความหมาย และประโยชน์ของการคุมกำเนิด	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
ประโยชน์ของการคุมกำเนิดชนิดถาวร		
ทำให้คู่สามีภรรยา ไม่กังวลต่อการมีบุตรและมีเวลาในการทำงาน	72	72.0
ปลอดภัย ไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ เกิดขึ้นเลย	10	10.0
ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่ทราบ	5 13	5.0 13.0

จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 67 ตอบสูงกว่าวิธีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราว หมายถึงการป้องกันไม่ให้มีบุตรระยะหนึ่งเมื่อเลิกใช้แล้วสามารถมีบุตรได้อีก ความหมายของวิธีการคุมกำเนิดชนิดถาวรตอบสูงกว่าไม่สามารถมีบุตรได้อีกร้อยละ 54. ประโยชน์ของการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราว ส่วนใหญ่ร้อยละ 64. ตอบสูงกว่ามีบุตรได้เมื่อมีความพร้อมของครอบครัว และประโยชน์ของการคุมกำเนิดชนิดถาวร ส่วนใหญ่ตอบถูกร้อยละ 72 ว่าทำให้คู่สามีภรรยา ไม่กังวลต่อการมีบุตรและมีเวลาในการทำงาน

ตาราง 12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้เรื่องการปฏิบัติของวิธีการ
คุมกำเนิด

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติของวิธีการคุมกำเนิด	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
วิธีการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด		
ต้องกินต่อเนื่องทุกวัน ไม่ลืม	97	97.0
กินเฉพาะก่อนมีเพศสัมพันธ์	1	1.0
กินยาของท่านหมดสามารถยืมยาเม็ดคุมกำเนิด- จากเพื่อนบ้านมารับประทานได้	1	1.0
ไม่ทราบ	1	1.0
วิธีการใช้ยาฉีดคุมกำเนิด		
ฉีดทุกเดือน	2	2.0
หลังมีประจำเดือนหายไป 15 วัน	1	1.0
ฉีดตามกำหนดทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่นัดให้มาฉีด	84	84.0
ไม่ทราบ	13	13.0
วิธีปฏิบัติเมื่อใส่ห่วงอนามัย		
ใส่เข้าไปค้างไว้ในช่องคลอด	30	30.0
ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกโดยเจ้าหน้าที่และ- ตรวจสายห่วงด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ	52	52.0
ใส่เข้าไปในท้อง	1	1.0
ไม่ทราบ	17	17.0

ตาราง 12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้ เรื่องการปฏิบัติของวิธีการ
คุมกำเนิด (ต่อ)

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติของวิธีการคุมกำเนิด	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
วิธีการทำหมันหญิง		
ตัดมดลูกทิ้ง	10	10.0
เย็บปิดปากมดลูก	2	2.0
ผูกตัดท่อรังไข่	57	57.0
ไม่ทราบ	31	31.0

จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้วิธีการกั้นยาคุมกำเนิดมากที่สุดคือ ร้อยละ 97 ตอบถูกว่าต้องกินต่อเนืองทุกวัน ไม่ลืม วิธีการใช้ยาฉีดคุมกำเนิดว่า ฉีดตามกำหนดทุกครั้ง⁸ ที่เจ้าหน้าที่นัดให้มาฉีดร้อยละ 84. วิธีปฏิบัติเมื่อใส่ห่วงอนามัยตอบว่า ใส่เข้าไปในโพรงมดลูก โดยเจ้าหน้าที่และตรวจสายห่วงด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอร้อยละ 52 และวิธีการทำหมันหญิง ตอบถูกร้อยละ 57 ว่าผูกตัดท่อรังไข่

ตาราง 13 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้เรื่องอาการข้างเคียงของวิธีคุมกำเนิด

ความรู้เรื่องอาการข้างเคียงของวิธีคุมกำเนิด	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
อาการข้างเคียงของยาเม็ดคุมกำเนิด		
คลื่นไส้ มีผื่นบนใบหน้า	60	60.0
มีประจำเดือนไม่ตรงตามกำหนด	11	11.0
ปวดท้องน้อยเวลา มีประจำเดือน	6	6.0
ไม่ทราบ	23	23.0
อาการข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิด		
คลื่นไส้ มีผื่นบนใบหน้า	6	6.0
มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือน เช่น ไม่มีประจำเดือน	72	72.0
น้ำหนักลดลง	6	6.0
ไม่ทราบ	16	16.0
อาการข้างเคียงของการใส่ห่วงอนามัย		
ปวดท้องน้อย ปวดหลัง	49	49.0
ปวดศีรษะ	1	1.0
ทำงานหนักไม่ได้	18	18.0
ไม่ทราบ	32	32.0

ตาราง 13 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้เรื่องอาการข้างเคียงของวิธีคุมกำเนิด(ต่อ)

ความรู้เรื่องอาการข้างเคียงของวิธีคุมกำเนิด	จำนวน (100)	ร้อยละ (100)
อาการข้างเคียงในการทำหมันหญิง		
ปวดศีรษะ	1	1.0
ปวดท้องภายใน 4-5 วัน หลังผ่าตัด	40	40.0
ทำงานหนักไม่ได้ 1 เดือน	34	34.0
ไม่ทราบ	25	25.0

จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้เรื่องอาการข้างเคียงของยาเม็ดคุมกำเนิดและตอบถูกว่า คลื่นไส้ มีฝ้าบนใบหน้า ร้อยละ 60 ตอบถูกว่ายาลูกอมคุมกำเนิดมีอาการข้างเคียงคือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือน เช่น ไม่มีประจำเดือนสูงถึงร้อยละ 72 ส่วนการใส่ห่วงอนามัยมีอาการข้างเคียงคือปวดท้องน้อย ปวดหลัง ตอบถูกร้อยละ 49. และการทำหมันหญิงตอบถูกร้อยละ 40. ว่ามีอาการข้างเคียงคือ ปวดท้องภายใน 4-5 วันหลังผ่าตัด

จากการทดสอบความรู้เรื่องการคุมกำเนิดพบว่า

- คะแนนความรู้เต็ม = 20 คะแนน
- คะแนนสูงสุด = 14 คะแนน
- คะแนนต่ำสุด = 2 คะแนน
- คะแนนเฉลี่ย = 9.42 คะแนน
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.82

ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ เพศของบุตรที่มีชีวิตอยู่ การปรึกษากับสามี เรื่องการคุมกำเนิด ความเชื่อในเรื่องผลของการคุมกำเนิด และเหตุผลในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดของกลุ่มตัวอย่าง

ตาราง 14 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตามกลุ่มอายุ

อายุ(ปี)	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
15 - 29	13 (46.4%)	15 (53.6%)	28
30 - 44	37 (51.4%)	35 (48.6%)	72
รวม	50	50	100

$\chi^2 = .200$

d.f. = 1

p > .05

จากตาราง 14 พบว่า ผู้ที่มีอายุ 30-44 ปี จะเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวมากกว่าผู้ที่มีอายุ 15-29 ปี คือ ร้อยละ 51.4 และ 46.4 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ที่มีอายุ 15-29 ปี จะเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดถาวรมากกว่าผู้ที่มีอายุ 30-44 ปี คือ ร้อยละ 53.6 และ 48.6 ตามลำดับ แต่ผลการทดสอบทางสถิติด้วยไค-สแควร์ พบว่า กลุ่มอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดทั้งชนิดชั่วคราวและถาวร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตาราง 15 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
อาชีพอื่น ๆ	31 (43.7%)	40 (56.3%)	71
แม่บ้าน	19 (65.5%)	10 (34.5%)	29
รวม	50	50	100

$\chi^2 = 3.934$ d.f. = 1 c = 0.195 p < .05

จากตาราง 15 พบว่าผู้ที่แม่บ้านจะมีการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวมากกว่าอาชีพอื่น ๆ คือ ร้อยละ 65.5 และ 43.7 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ที่แม่บ้านเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดถาวรมากกว่าผู้ที่แม่บ้าน คือ ร้อยละ 56.3 และ 34.5 ตามลำดับ และผลจากการทดสอบทางสถิติไค-สแควร์พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ค่าความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตาราง 16 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตาม รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
< 3,000	18 (36.0%)	32 (64.0%)	50
> 3,000	32 (64.0%)	18 (36.0%)	50
รวม	50	50	100

$$\chi^2 = 6.76 \quad d.f. = 1 \quad c = 0.252 \quad p < .05$$

จากตาราง 16 พบว่า ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 3,000 บาท เลือกใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวมากกว่าชนิดถาวรคือ ร้อยละ 64 และ 36 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท เลือกใช้วิธีคุมกำเนิดถาวรมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 3,000 บาท คือ ร้อยละ 64 และ 36 ตามลำดับ และจากผลการทดสอบทางสถิติด้วยไค-สแควร์ พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ค่าความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ต่ำซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตาราง 17 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	37 (46.8%)	42 (53.2%)	79
ระดับสูงกว่าประถมศึกษา	13 (61.9%)	8 (38.1%)	21
รวม	50	50	100

$$\chi^2 = 1.51 \quad d.f. = 1 \quad p > .05$$

จากตาราง 17 พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าชั้นประถมศึกษาเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คือ ร้อยละ 61.9 และ 46.8 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ที่มีศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดถาวรมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา คือ ร้อยละ 53.2 และ 38.1 ตามลำดับ แต่ผลการทดสอบทางสถิติด้วยไค-สแควร์ พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดทั้งชนิดชั่วคราวและถาวร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตาราง 18 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตามจำนวนบุตรมีชีวิต

จำนวนบุตรมีชีวิต	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
2 คน	47 (51.7%)	44 (48.3%)	91
2 คนขึ้นไป	3 (33.3%)	6 (66.7%)	9
รวม	50	50	100

Fisher's exact test ได้ $p = 0.487$

จากตาราง 18 พบว่า ผู้ที่มีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 2 คนเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดชั่วคราวมากกว่าผู้ที่มีบุตร 2 คนขึ้นไป คือ ร้อยละ 51.7 และ 33.3 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ที่มีบุตร 2 คนขึ้นไปเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดถาวรมากกว่าผู้ที่มีบุตร 2 คน คือ ร้อยละ 66.7 และ 48.3 ตามลำดับ และผลจากการทดสอบทางสถิติด้วยฟิชเชอร์ เอ็กแซกต์ พบว่าจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตาราง 19 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตามเพศของบุตรที่มีชีวิตอยู่

เพศของบุตรที่มีชีวิตอยู่	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
มีทั้ง 2 เพศ	24 (50.0%)	24 (50.0%)	48
มีเพศเดียว	26 (50.0%)	26 (50.0%)	52
รวม	50	50	100

จากตาราง 19 พบว่า ผู้ที่มีบุตรครบทั้งเพศชายและหญิง และผู้ที่มีบุตรเพศเดียวเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวรไม่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ 50 เท่ากัน

ตาราง 20 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตาม การปรึกษากับสามีเรื่องวิธีการคุมกำเนิด

การปรึกษากับสามี เรื่องวิธีการคุมกำเนิด	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
ปรึกษา	33(41.3%)	47(58.7%)	80
ไม่ปรึกษา	17(85.0%)	3(15.0%)	20
รวม	50	50	100

$\chi^2 = 12.25$ d.f. = 1 c = 0.930 p < .05

จากตาราง 20 พบว่า ผู้ที่ไม่ปรึกษามีเรื่องการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดจะเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวมากกว่าผู้ที่ปรึกษา คือ ร้อยละ 85. และ 41.3 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ที่ปรึกษาสามีจะเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดถาวรมากกว่าผู้ที่ไม่ปรึกษา ร้อยละ 58.7 และ 15 ตามลำดับ จากการทดสอบทางสถิติด้วยไค-สแควร์ พบว่า การปรึกษากับสามีมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตาราง 21 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตาม
คะแนนความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องผลของการคุมกำเนิด

คะแนนความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องผลของการคุมกำเนิด	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย	31 (66.0%)	16 (34.0%)	47
มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ย	19 (35.9%)	34 (64.1%)	53
รวม	50	50	100

$\chi^2 = 7.868$ d.f. = 1 c = 0.270 p < .01
 คะแนนเฉลี่ย (\bar{x}) = 13.47 คะแนน S.D = 3.25
 คะแนนสูงสุด = 18 คะแนน
 คะแนนต่ำสุด = 6 คะแนน

จากตาราง 21 พบว่า ผู้ที่คะแนนความเชื่อที่ถูกต้องน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวมากกว่าผู้ที่คะแนนความเชื่อมากกว่าค่าเฉลี่ย คือ ร้อยละ 66 และ 35.9 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ที่คะแนนความเชื่อมากกว่าค่าเฉลี่ยเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดถาวรมากกว่าผู้ที่คะแนนความเชื่อต่ำกว่าค่าเฉลี่ย คือ ร้อยละ 64.1 และ 34 ตามลำดับ ผลจากการทดสอบทางสถิติด้วยไค-สแควร์ พบว่าคะแนนความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิดมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดทั้งชนิดชั่วคราวและถาวรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตาราง 22 จำนวนและร้อยละในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร จำแนกตาม เหตุผลในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด

เหตุผลในการเลือกใช้ วิธีคุมกำเนิด	การเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด		รวม
	ชนิดชั่วคราว	ชนิดถาวร	
ไม่ต้องการบุตรเพิ่ม	4 (12.9%)	27 (87.1%)	31
สะดวกดี และอื่น	46 (66.7%)	23 (33.3%)	69
รวม	50	50	100

$$\chi^2 = 24.72 \quad \text{d.f.} = 1 \quad \text{c} = 0.445 \quad \text{p} < .01$$

จากตาราง 22 ผู้ที่ให้เหตุผลในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดว่าสะดวกดีและอื่น ๆ เลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวมากกว่าผู้ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการบุตรเพิ่ม คือ ร้อยละ 66.7 และ 12.9 ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการบุตรเพิ่มเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดถาวรมากกว่าผู้ให้เหตุผลว่าสะดวกดี และอื่น ๆ คือ ร้อยละ 87.1 และ 33.3 ตามลำดับ จากการทดสอบทางสถิติด้วยไค-สแควร์พบว่าเหตุผลในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

