

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ อัคมโนทัศน์ ความวิตกกังวลทางสังคม และความตั้งใจเลิกยา
ของผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

ผู้เขียน นางวันเพ็ญ อานาจกิติกร

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
รองศาสตราจารย์พรพิมล วรอุทัยพงษ์

บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัคมโนทัศน์ ความวิตกกังวลทางสังคม และความตั้งใจเลิกยา ระหว่างผู้ติดยาเสพติดในระยะถอนพิษยา และระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ จำนวน 160 คน แบ่งเป็นระยะถอนพิษยา จำนวน 80 คน และระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 80 คน การคัดเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ บนพื้นฐานของความสมัครใจ วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจในรูปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด แบบวัดอัคมโนทัศน์ แบบวัดความวิตกกังวลทางสังคม และแบบวัดความตั้งใจเลิกยาเสพติด วิเคราะห์ข้อมูลหลักโดยการทำการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพมีคะแนนอัคมโนทัศน์ และความตั้งใจเลิกยาสูงกว่าผู้ติดยาเสพติดในระยะถอนพิษยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2) ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพมีคะแนนความวิตกกังวลทางสังคมต่ำกว่าผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะถอนพิษยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

Independent Study Title Self-Concept, Social Anxiety and Intention for Abstinence of Drug Addicts in Chiang Mai Drug Dependent Treatment Center

Author Mrs. Wanpen Amnajkitikorn

Degree Master of Science (Counseling Psychology)

Independent Study Advisor Associate Prof. Pornpimol Worawutbudhapongs

Abstract

This Independent study aims at comparing the self-concept, social anxiety, and intention of drug abstinence between drug addicts who had received the treatment in the detoxification stage and the rehabilitation stage. The subjects were 160 who were drug addicts in-patients at Chiang Mai Drugs Dependence Treatment Centre. They were separated to 80 addicts treated in detoxification stage and 80 addicts treated in rehabilitation stage. All of them were selected by stratified sampling on voluntary basis. This is a cross-sectional survey research. Tools used in data collection were questionnaires in the general information and drug-use behavior, self concept scale, the social anxiety scale, the and the drug-abstinence determination scale. The hypothesis was tested by t-test.

The results showed that 1) the drug addicts in the rehabilitation stage have higher self-concept and drug-abstinence scores than the drug addicts in the detoxification stage at the .001 level. 2) The drug addicts in the rehabilitation stage have a significant lower social anxiety score than the drug addicts in the detoxification stage at .001 level.