

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง

ผู้เขียน นางจินตนา คำระยอม

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปิ่นคำ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ อุบล นิวัติชัย กรรมการ

บทคัดย่อ

ผู้ที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่มีภาวะโรคร่วม หากการประเมินไม่ครอบคลุมจะทำให้การดูแลเป็นไปอย่างไม่ครบถ้วน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบกำหนดคุณสมบัติจากผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุงระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2547 จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามบุคลิกภาพแปรปรวน PDQ – 4 ของไฮเลอร์ (Hyer, 1994) แปลย้อนกลับเป็นภาษาไทยโดย กชพร พงษ์รัตนสวัสดิ์, อุบล นิวัติชัย และ ภัทราภรณ์ ทุ่งปิ่นคำ (2545) มีค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีวัดซ้ำเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา จำนวนร้อยละ 88.98 มีบุคลิกภาพแปรปรวน โดยมีบุคลิกภาพประเภทย้ำคิดย้ำทำร้อยละ 87.40 ประเภทหวาดระแวงร้อยละ 77.95 ประเภทคาบเส้นร้อยละ 65.35 ประเภทหลีกเลี่ยงร้อยละ 65.35 และประเภทจิตเภทแฝงร้อยละ 58.27 ตามลำดับ

ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา มีบุคลิกภาพแปรปรวนร่วมด้วย ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราควรได้รับการประเมินและตรวจวินิจฉัยบุคลิกภาพแปรปรวน เพื่อจะได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม

Independent Study Title Personality Disorders of Persons with Alcohol Induced
Psychotic Disorders Admitted to Suanprung Psychiatric
Hospital

Author Mrs. Jintana Kammayorm

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Assistant Professor Dr. Patraporn Tungpunkom Chairperson

Associate Professor Ubol Niwatichai Member


ABSTRACT

Person with substance abuse mostly have comorbidity. Therefore, assessment for coexis disorders should be emphasized to enhance the comprehensive care. The purpose of this descriptive study was to examine the personality disorders of persons with alcohol induced psychotic disorders. The subjects who met inclusion criteria were selected into study. These consisted of 127 persons with alcohol induced psychotic disorders who admitted to Suanprung psychiatric Hospital, Chiang Mai province during January to February , 2004. The study instrument was a Questionnaire consisting of two parts:1) Demographic, and Data 2) Personality Diagnosis questionnaire – 4 (PDQ-4) developed by Hyler (1994) which was back translated into Thai by Kotchaphon Phongrattanasawat , Ubol Niwatichai and Patraporn Tungpunkom (2002). Reliability of the instrument obtained by teat-retest was 0.83. Data were analyzed by using descriptive statistics.

The results revealed that 88.98 percent of the subject reported as having personality disorders. Considering to each type of personality disorders, it is found that 87.40 percent of the subjected having the obsessive compulsive personality disorders, followed by paranoid

personality disorders (77.95%), borderline personality disorders (65.35%), avoidant personality disorders (65.35%), and schizotypal personality disorders (58.27%) respectively.

The findings of this study indicated the comorbidity of the personality disorders in persons with alcohol induced psychotic disorders. Therefore, person with alcohol induced psychotic disorders should be assessed and diagnosed for personality disorders in order to provide a comprehensive care.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved