

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การปรับทางจิตสังคมของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่ได้รับการรักษา
แบบเมทริกซ์โปรแกรม จังหวัดแพร่

ผู้เขียน

นางวัชลี อินตะสงค์

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปิ่นตา ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ กรรมการ

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงจากการเสพติดสาร
เฮโรอีนมาเป็นแอมเฟตามีน จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่ผ่านมา พบว่า
หลังจากได้รับการบำบัดรักษาแล้ว มักมีอัตราการกลับไปเสพสารแอมเฟตามีนซ้ำสูง โดยปัจจัยเหตุ
ที่สำคัญปัจจัยหนึ่งคือ การปรับทางจิตสังคมที่ไม่ดี

การศึกษาเชิงพรรณนาค้างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการปรับทางจิตสังคมของ
ผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่ได้รับการรักษาแบบเมทริกซ์โปรแกรมจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดสาร
แอมเฟตามีนที่ได้รับการรักษาแบบเมทริกซ์โปรแกรมของโรงพยาบาลในจังหวัดแพร่ ซึ่งมาติดตาม
ผลหลังครบโปรแกรม 1 ปี ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน 2547 จำนวน 185 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามการ
ปรับทางจิตสังคมต่อภาวะติดยาเสพติด ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินการปรับทางจิตสังคม
ต่อภาวะความเจ็บป่วยของ มุกดา คุณาวุฒินันท์ (2535) ซึ่งแปลและดัดแปลงจากแบบวัดของ เดอ โรเกติส
(1986) คำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
มีค่าเท่ากับ.81 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า การปรับทางจิตสังคมของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่ได้รับการรักษาแบบ
เมทริกซ์โปรแกรมครบ 1 ปี มีการปรับทางจิตสังคมโดยรวมดีร้อยละ 50.47 และการปรับทาง
จิตสังคมโดยรวมไม่ดีร้อยละ 49.53

ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการบำบัดรักษา
ผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่ได้รับการรักษาแบบเมทริกซ์โปรแกรม เพื่อส่งเสริมงานเมทริกซ์โปรแกรม
ต่อไป



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Psychosocial Adjustment Among Amphetamine Dependents who Received the Matrix Program in Phrae Province

Author Mrs. Watchalee Intasong

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr. Darawan Thapinta Chairperson

Assistant Professor Srinuan Wiwatkunupakan Member


ABSTRACT

Presently, there is an increasing of substance dependence which has changed from heroine to amphetamines. Previous data reveals that after therapy, these persons tend to relapse. One important factor related to this relapse is inappropriate psychosocial adjustment.

This descriptive study was designed to examine the psychosocial adjustment among amphetamine dependents who received the Matrix Program in Phrae Province. The sample consisted of 185 persons with amphetamine dependence who completed the Matrix Program within 1 year at the hospital in Phrae Province during March to April, 2004. The instrument of this study was a questionnaire consisting of two parts: the Personal Data Recording Questionnaire and the Psychosocial Adjustment to Substance Dependence Questionnaire, which was translated into Thai and modified by Mukda Kunawat (1992) based on the Psychosocial Adjustment to Illness Inventory of Derogatis (1986). The reliability of the questionnaire was tested by Cronbach's alpha coefficient for the Psychosocial Adjustment to Substance Dependence Inventory, and was .81. Data were analyzed by descriptive statistics.

The results indicated that persons with amphetamine dependence who received the Matrix Program showed appropriate psychosocial adjustment at 50.47 % and showed inappropriate psychosocial adjustment at 49.53%.

This finding therefore, could be used as preliminary data for staff who treat persons with amphetamine dependence using the Matrix Program to enhance Matrix Program service.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved