

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็น โรคลมชักที่ได้รับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลสวนปรุง

ผู้เขียน นายประดิษฐ์ ชัยชนะ

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ติ่งปิ่นดา ประธานกรรมการ  
อาจารย์สมบัติ สกุดพรรณ กรรมการ

บทคัดย่อ

ผู้ที่เป็น โรคลมชักจะมีปัญหาภาวะโรคร่วมอย่างน้อยหนึ่งโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวเองในด้านการรักษา โรคซึมเศร้าเป็นภาวะโรคร่วมที่สำคัญซึ่งมักจะพบในผู้ที่เป็น โรคลมชัก ดังนั้นจึงควรต้องมีการประเมินและคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในขณะที่ให้การดูแลในผู้ที่เป็นโรคลมชักนี้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็น โรคลมชักที่ได้รับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 86 คน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2548 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบ็ค (BDI-1A) แปลเป็นภาษาไทย โดย มุกดา ศรียงค์ (2522) ซึ่งได้รับการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 58.10 ของผู้ที่เป็น โรคลมชักที่ได้รับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง มีภาวะซึมเศร้าตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงระดับรุนแรง โดยผู้ที่เป็น โรคลมชัก มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 32 ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางร้อยละ 16 ภาวะซึมเศร้าระดับมากร้อยละ 38 และมีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรงร้อยละ 14

ผลการศึกษานี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้การช่วยเหลือ เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็น โรคลมชักที่ได้รับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง และมีภาวะซึมเศร้าระดับมาก ซึ่งต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

**Independent Study Title** Depression Among Persons with Epilepsy at Out Patient

Department of Suan Prung Psychiatric Hospital

**Author** Mr. Pradit Chaichana

**Degree** Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

**Independent Study Advisory Committee**

Associate Professor Dr. Darawan Thapinta Chairperson

Lecturer Sombat Skulphan Member


**ABSTRACT**

Persons with epilepsy have problems with at least one co-morbidity which affected their treatment plan. Depression is the important co-morbidity found in persons with epilepsy. Thus, assessment and screening for depression should be implement while giving care for these persons.

This descriptive study aimed to examine the level of depression among 86 persons with epilepsy at out patient department of Suan Prung Psychiatric Hospital, from March to April 2005. The study instrument was a questionnaire that consisted of two parts; the Demographic Data, and the Beck Depression Inventory (BDI-1A) (Beck, 1967) translated into Thai by Mookda Sriyong (1979). The reliability obtained by Cronbach's alpha coefficient was 0.94. Data were analyzed using descriptive statistics.

The result revealed that 58.10 percent of persons with epilepsy at out patient department of Suan Prung Psychiatric Hospital had depression from minimal level to severe level. Within this group, it was found 32 percent were at minimal depression, 16 percent were at mild-moderate depression, 38 percent were at moderate-severe depression and 14 percent were at severe depression.

The findings of this study could be applicable as preliminary data to plan for intervention in decreasing depression among persons with epilepsy at out patient department of Suan Prung Psychiatric Hospital, especially those who report severe and moderate-severe level of depression as these groups need further appropriate treatment.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved