ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพื้นฟูสภาพทางร่างกายและ จิตใจของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราใน

โรงพยาบาลทองแสนขั้น จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้เขียน

นางสาวอังคาร สอนถา

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ คร. คาราวรรณ ต๊ะปืนตา ประธานกรรมการ อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ กรรมการ

บทคัดย่อ

การใช้ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่ สัมพันธ์กับการคื่มสุราในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรคิตถ์ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ระบบบริการในการดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการคื่มสุรา ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการคื่มสุราจัดทำขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้ง การระดมความคิดของทีมพัฒนาคุณภาพุโรงพยาบาลและทีมผู้ปฏิบัติของโรงพยาบาลทองแสนขัน มีการทดลองใช้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ของ ข้อกำหนดและการประเมินกระบวนการ

การศึกษาข้อมูลย้อนหลังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการใช้ข้อกำหนด และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของการใช้ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มี ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัด อุตรคิตถ์ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือแฟ้ม ประวัติผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการคื่มสุราจำนวน 64 แฟ้ม และพยาบาลทีมผู้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด จำนวน 4 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แนวคิด ซิปโมเคล ประกอบด้วยแบบสำรวจ หลลัพธ์ของการใช้ข้อกำหนดการพื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์ กับการดื่มสุรา และกระบวนการการใช้ข้อกำหนดดังกล่าว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวน วรรณกรรม

ผลการศึกษาพบว่า

- 1. ผลลัพธ์จากการใช้ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุรา พบว่า
- 1.1 ผู้ป่วยได้รับการบำบัดในระยะฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจครบตาม กระบวนการ ร้อยละ 67.19 และ ร้อยละ 32.81 บำบัดไม่ครบตามกระบวนการ
- 1.2 หลังจากสิ้นสุคกระบวนการบำบัดในระยะพื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจแล้ว ผู้ป่วยไม่กลับไปดื่มซ้ำหรือเลิกดื่มได้ ร้อยละ 48.44 และในช่วง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน มีผู้ป่วยกลับไป คื่มสุราซ้ำ ร้อยละ15.63, 18.75, 3.12 ตามลำดับ
- 1.3 ผู้ป่วยกลับไปดื่มซ้ำ ในระคับปลอดภัย ร้อยละ 23.44 ดื่มแบบไม่ปลอดภัย ร้อยละ 12.50
- 1.4 ผู้ป่วยมีแนวทางในการป้องกันการกลับไปคื่มซ้ำ ร้อยละ 53.13 ไม่มีแนวทาง ในการป้องกันการกลับไปคื่มซ้ำ ร้อยละ 32.81
- ความคิดเห็นของทีมผู้ปฏิบัติต่อกระบวนการการใช้ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทาง ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในด้านกระบวนการ พบว่า
- 2.1 ร้อยละ 100.00 ของทีมผู้ปฏิบัติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยในเรื่องการ การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถใช้ได้ในการดูแลผู้ป่วย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ ดูแลผู้ป่วย ทีมผู้ปฏิบัติมีความพึงพอใจในการใช้ข้อกำหนด
- 2.2 ร้อยละ 75.00 ของทีมผู้ปฏิบัติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ใน ข้อกำหนดว่ามีความสะควกในการใช้ และทีมผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

ผลการศึกษาครั้งนี้แสคงให้เห็นว่าข้อกำหนคสามารถนำมาใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ และ ผลการศึกษายังสามารถนำไปปรับปรุงข้อกำหนค และปรับปรุงวิธีการนำข้อกำหนคมาใช้อย่าง เหมาะสมต่อไป Independent Study Title Evaluation of Implementing Physical and Psychological

Rehabilitation for Patients with Alcohol Related Disorders Protocol

in Thongsaenkhan Hospital, Uttaradit Province

Author

Miss Aungkarn Sontha

Degree

Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr. Darawan

Thapinta

Chairperson

Lecturer Siriluck

Vadtanapong N

Member

ABSTRACT

Implementing the physical and psychological rehabilitation for patients with alcohol related disorders protocol in Thongsaenkhan hospital is part of the system development for physical and psychological rehabilitation for patients with alcohol related disorders. The protocol was developed from reviewed literature and brainstorming among the quality development team and care giver team in Thongsaenkhan hospital. This protocol has been tested since October 2004. However there has been no evaluation for the process and outcomes of the protocol.

This retrospective study evaluated the implementing the physical and psychological rehabilitation for patients with alcohol related disorders and examined the opinions about using of the protocol in Thongsaenkhan hospital, Uttaradit province during October 2005 to September 2006. The sample were a team of 4 nurses who cared for patients with alcohol related disorders and 64 files of patients with alcohol related disorders. This study instrument was based on the

CIPP model comprising the outcome survey form of using the protocol to care patients with alcohol related disorders and the opinion survey form about process of using the protocol.

The results of the study showed that:

- 1. The outcomes of implementing physical and psychological rehabilitation for patients with alcohol related disorders protocol showed that:
- 1.1 Sixty seven point one nine percent of patients completed the protocol whereas 32.81% of the patients did not complete the protocol.
- 1.2 After finishing the physical and psychological rehabilitation for patients with alcohol related disorders protocol, 48.44% of the patients did not drink, however after 1, 3, and 6 months, 15.61%, 18.70%, and 3.12% of them returned to drink respectively.
- 1.3 Regarding the level of drinking in the patients who returned to drink, 23.44% of them drank at a safe level and 12.50% of them drank at an unsafe level.
- 1.4 Fifty three point one three percent of patients had means to prevent themselves from returning to drink, whereas 32.81% showed no means for prevention.
- 2. The opinion about using of the protocol with patients with alcohol related disorders in process evaluation among the care team, the result revealed that:
- 2.1 One hundred percent of nurses agreed that the protocol were easy to use, clear, not complicated, and cost effective in caring for the patients with alcohol related disorders.
 They were all satisfied with the protocol.
- 2.2 Seventy five percent of nurses agreed that the protocol was conveniently implemented and it was practical.

The study results showed that most of the activities in the protocol were practical and the results can also be used as data for improving the means for implementing protocol in effective ways.