

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ของผู้ที่เป็นโรคจิตสุราโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้เขียน นางสาวสุนันทา อินตะจอมวงศ์

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

อาจารย์ ดร.हरรรษา	เศรษฐบุปผา	ประธานกรรมการ
อาจารย์ขวัญพนมพร	ธรรมไทย	กรรมการ

บทคัดย่อ

โรคจิตสุราส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่เป็นโรคจิตสุรา เกิดจากปัจจัยที่หลากหลายและการสนับสนุนทางสังคมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคจิตสุรา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคจิตสุราที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 101 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เป็นโรคจิตสุรา 2) แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Use Disorder Identification Test: AUDIT [WHO]) 3) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนที่ 2 ของ Personal Resource Questionnaire (PRQ 2000) พัฒนาโดยไวเนอร์ท (Weinert, 2000) แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ และ แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม นำมาตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .95 และ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coefficient) ผลการศึกษา พบว่า

การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคจิตสูรา มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำ ($r = -0.482, p < .01$) และการสนับสนุนทางสังคมรายด้านของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคจิตสูรา มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ โดยในรายด้าน พบว่า

1. การสนับสนุนทางสังคมด้านความใกล้ชิดและความรักใคร่ผูกพัน มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำ ($r = -0.491, p < .01$)
2. การสนับสนุนทางสังคมด้านการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำ ($r = -0.355, p < .01$)
3. การสนับสนุนทางสังคมด้านการได้ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่น มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำ ($r = -0.415, p < .01$)
4. การสนับสนุนทางสังคมด้านการได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำ และ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำ ($r = -0.497, p < .01$)
5. การสนับสนุนทางสังคมด้านการได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีระดับของความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ปานกลาง ($r = -0.545, p < .01$)

ผลการศึกษานี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนให้มีการสนับสนุนทางสังคมในผู้ที่เป็นโรคจิตสูราให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน นอกจากนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคจิตสูรา

Independent Study Title Social Support and Alcohol Drinking Behaviors Among Persons with Alcohol Dependence in Thungsaliang Hospital, Sukhothai Province

Author Miss. Sunantha Intachomwong

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Lecturer Dr.Hunsa	Sethabouppha	Chairperson
Lecturer Kwaunpanomporn	Thummathai	Member

ABSTRACT

Alcohol Dependence is a significant problem which has impacts on patients, family, society and economy. Alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence caused from several factors. Social support may be one factor which correlated to alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence.

This descriptive correlation study was designed to understand the relationship between social support and alcohol drinking behaviors of persons with alcohol dependence. Samples were 101 persons with alcohol dependence receiving services from Thungsaliang Hospital, Sukhothai Province. The study instruments were 1) the demographic data 2) the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), and 3) the Personal Resource Questionnaire (PRQ-2000) part 2 developed by Weinert (2000). Reliability of the AUDIT and PRQ-2000 were ensured by Cronbach's alpha coefficient and were .95 and .90, respectively. Data were analyzed by using descriptive statistics and pearson's product moment correlation coefficient.

Finding were as follows:

The over all social support of sample of alcohol dependence had a low level significant negative correlation between with alcohol drinking behaviors ($r = -.482, p < .01$). Focusing on each domain of social support, it was found that

1. The attachment domain of social support had a low level significant negative correlation with alcohol drinking behaviors ($r = -.491, p < .01$).
2. The social integration domain of social support had a low level significant negative correlation with alcohol drinking behaviors ($r = -.355, p < .01$).
3. The opportunity for nurturance domain of social support had a low level significant negative correlation with alcohol drinking behaviors ($r = -.415, p < .01$).
4. The assistance/guidance domain of social support had a low level significant negative correlation with alcohol drinking behaviors ($r = -.497, p < .01$).
5. The reassurance of worth domain of social support had a medium level significant negative correlation with alcohol drinking behaviors ($r = -.545, p < .01$).

The study results could served as basic information in providing social support and helped developing social support program for reducing alcohol behaviors among persons with alcohol dependence.