

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดหูหรือ
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้เขียน นางสาวศีตกาล พรหมวิมานรัตน์

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภรณ์ ทุ่งปันคำ

บทคัดย่อ

การสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญของสังคม ซึ่งผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น ที่เป็นโรคติดหูหรือ จำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์การดูแลสำหรับเด็กกลุ่มนี้ เพื่อวางแผนให้การดูแลได้อย่างเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดหูหรือ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงประกอบด้วยเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดหูหรือ ที่ศึกษา ในโรงเรียนมัธยม ประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 ราย ครูประจำชั้นผู้ดูแลเด็กกลุ่มนี้จำนวน 10 ราย แกนนำชุมชนจำนวน 10 ราย และพยาบาลผู้รับผิดชอบให้การดูแลเด็กกลุ่มนี้ จำนวน 1 ราย รวบรวม ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ 2) แนวทางการสัมภาษณ์รายบุคคลและรายกลุ่มที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า

1) เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่มีความรู้และไม่แน่ใจในการปฏิบัติตัวเพื่อเลิกสูบบุหรี่ไม่มีความเชื่อมั่นในวิธีการช่วยเหลือ มีทัศนคติว่าการบำบัดทำให้เสียเวลาเรียน กลัวผู้ปกครองตำหนิ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้สูบบุหรี่จึงไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้

2) ครูผู้ดูแลมีทัศนคติว่าการดูแลไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง

3) แกนนำชุมชนไม่ได้รับการยอมรับในการให้การดูแล แม้จะมีการปฏิบัติการช่วยเหลือหลากหลาย แต่ผลที่ได้ไม่สำเร็จ และไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการดูแลเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้

4) พยาบาลมีความเห็นว่าการรักษาขาดความต่อเนื่อง ขาดความร่วมมือในการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีทัศนคติว่าการช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่มีประสิทธิภาพ

5) กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะแนวทางในการจัดการสถานการณ์การดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดยาเสพติด การดูแลควรเป็นแบบต่อเนื่องและเหมาะสม และการพัฒนาแนวทางในการดูแลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลครบถ้วนและต่อเนื่อง

ผลการศึกษานี้ทำให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์การดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดยาเสพติด ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดยาเสพติดในโรงพยาบาล หวังเสถียรต่อไป



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

Independent Study Title	Situational Analysis of Caring for Adolescents with Nicotine Dependence, Thungsaliem Hospital, Sukhothai Province
Author	Miss Sritakarn Phromwimanrat
Degree	Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)
Independent Study Advisor	Associate Prof. Dr. Patraporn Tungpunkom

ABSTRACT

Smoking in adolescents is a major problem in society. Caregivers of adolescents with nicotine dependence need to understand the caring situation in order to be able to plan for appropriate intervention. This study aimed to analyze the situation of caring for adolescents with nicotine dependence. The samples were purposively recruited and consisted of 10 adolescents with nicotine dependence in secondary school of Thungsaliem district, Sukhothai province; 10 teachers who were caretakers of this adolescent group; 10 community leaders; and a nurse who was responsible to take care this group of adolescent. Data were collected from June to August 2010. The instruments used in this study were 1) a personal information questionnaire and 2) an interview guideline for individual and group developed by researcher based on literature review. Data were analyzed using descriptive statistics and content analysis.

The results revealed as follows.

1) The adolescents with nicotine dependence did not have knowledge and felt uncertain to quit smoking, lacked confidence in the method of assistance, had attitude towards treatment in that it would waste their study time, were afraid that they would be blamed by their parents, and were surrounded with smoking environment so that they could not quit smoking.

2) Teachers who were caretakers had attitude that caring was not efficient, lacked cooperation from related organizations, and lacked continuing care.

3) The community leaders were not accepted to provide care. Although various helping methods were implemented, they were not successful. There was no cooperation from related organizations in caring for this group of children.

4) Nurses thought that their treatment was not done continuously, lacked cooperation from related organizations, and had attitude that caring was not efficient.

5) Samples gave suggestions for caring of children with nicotine dependence including continuous and appropriate care, and development of a caring guideline for related organization in order to cooperatively provide comprehensive and continuing care.

The results of this study provide understanding on the caring situation of adolescents with nicotine dependence. These results could be used to develop the system of care for adolescents with nicotine dependence in Thungsaliang hospital.

