

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยมาลาเรีย:
กรณีศึกษา หมู่บ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน

ชื่อผู้เขียน นายเชษฐชัย ศรีชูชาติ

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงหนะตร ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา ประพุทธิติสาร กรรมการ

อาจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักษาริยะธรรม กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยมาลาเรียกรณีศึกษา หมู่บ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาปัจจัยด้าน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ด้านสังคมจิตวิทยา ด้านการประเมินค่าอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มาลาเรีย และด้านคุณลักษณะของแหล่งบริการรักษาโรคประเภทต่าง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ สาธารณสุขว่ามีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาใช้มาลาเรียหรือไม่และอย่างไร และผู้ป่วยมาลาเรีย เลือกใช้แหล่งบริการแผนปัจจุบันและแผนโบราณแตกต่างกันหรือไม่และอย่างไร ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยมาลาเรียมีขั้นตอนการรักษาใช้มาลาเรีย 3-4 ขั้นตอนการรักษา ซึ่งในแต่ละขั้นตอน การรักษาใช้มาลาเรียมีความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ช่วยในการตัดสินใจเลือก แหล่งบริการรักษา จากการทดสอบการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรักษาใช้ มาลาเรียโดยวิธีการ Weaver Combination พบว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดมีความแตกต่างกันในแต่ละ ขั้นตอนการรักษา และขั้นตอนการรักษาที่ 1-3 ผู้ป่วยมาลาเรียเลือกใช้บริการรักษาแผน ปัจจุบันมากที่สุด แต่ขั้นตอนการรักษาที่ 4 ผู้ป่วยเลือกใช้บริการรักษาแผนโบราณมากกว่าแผนปัจจุบัน

Independent Study Title : Factors Affecting Alternative Use of Health
Care Services by Malaria Patients : A Case
Study of Huai Tom Village, Tambon Nasai, Li
District, Lamphun Province

Author

Chettachai Srichuchat

M.S.

Geography

Examining Committee :

Assist.Prof.Dr.Anchalee Singhanetra Chairman

Assist.Prof.Nitaya Prabhudanitisarn Member

Lecturer Dr.Pong-in Rakariyatham Member

Abstract

This study of the factors affecting health-care decision-making by malaria patients in Huai Tom Village, Tambon Nasai, Li District, Lamphun Province had the following objectives. These were to study demographic, socio-economic, and socio-psychological factors as well as how the patients determine which course of treatment to adopt. Another objective was to determine the characteristics of the different sources of medical care for different types of disease. These sources, both inside and outside the public health care system, were studied to determine whether and to what extent patients made their treatment decisions. This study found that malaria patients followed a 3-4 stage decision-making process. Each stage comprises several different related factors. Following a testing of the

importance of different factors affecting malaria treatment choices by the Weaver Combination Method, it was found that the most important factors operated differently at each stage. Furthermore, at stages 1-3, malaria patients selected modern medical resources. However, at stage 4, they selected traditional medicine more often.