

วิทยานิพนธ์

การศึกษาอิทธิพลของด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
กานตะวันต่อในโตรเจนและความหนาแน่นของต้นปลูก

ชื่อผู้เรียน

นายชัชวิจัก ถนนกีน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

รศ. เฉลิมพล แซมເພິ່າ

ประธานกรรมการ

ผศ. ดร. สุนกร บุรณะวิริยะกุล

กรรมการ

ผศ. ดร. สุชาติ จิพรเจริญ

กรรมการ

อาจารย์พุกษ์ ยิบมันทะลิริ

กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาอิทธิพลของด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของกานตะวันต่อในโตรเจนและความหนาแน่นของต้นปลูกที่ได้รับในโตรเจนพันธุ์ลูกผสม (AS 540) ได้ดำเนินการที่แปลงทดลองภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2530 โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot มีอัตราของในโตรเจน 4 ระดับคือ 0, 8, 16 และ 24 กก./ไร่ เป็น main plot และความหนาแน่นของต้นปลูก 3 ระดับคือ 3200, 6400 และ 12800 ต้น/ไร่ เป็น sub-plot ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามในโตรเจนที่ใส่เพิ่มขึ้น กานตะวันที่ได้รับในโตรเจนอัตรา 0, 8, 16 และ 24 กก./ไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 410, 440, 487 และ 494 กก./ไร่ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการใส่ในโตรเจนเพิ่มขึ้นส่งผลให้น้ำหนักแห้งและต้นพื้นที่ใบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เบอร์เซนต์ปริมาณยังเพิ่มขึ้นตามในโตรเจนที่ใส่เพิ่มขึ้นด้วย แต่

สำหรับความสูงและขนาดของลำต้น องค์ประกอบของผลผลิต (ขนาดของงานดอก จำนวนเมล็ด ต่องานดอก และน้ำหนัก 100 เมล็ด) และเปอร์เซนต์น้ำมัน ไม่แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอิทธิพลของความหนาแน่นของต้นปลูกพบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น ความหนาแน่นให้ผลผลิตเฉลี่ย 394, 488 และ 492 กก./ไร่ตามลำดับ ซึ่งเนื่องมาจาก การเพิ่มความหนาแน่นของต้นปลูกไม่ใช่การเพิ่มผลผลิตต่อต้น ในด้านการเจริญเติบโตพบว่า การเพิ่มความหนาแน่นของต้นปลูกทำให้ความสูงเพิ่มขึ้น แต่ขนาดของลำต้นและองค์ประกอบของผลผลิตลดลง เมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้น สำหรับเปอร์เซนต์น้ำมันและปริมาณไม่แสดงความแตกต่างกัน จากผลการทดลองดังกล่าว ไม่พบความสัมพันธ์ร่วม (interaction) ระหว่างใบโตรเจนและ ความหนาแน่นของต้นปลูกต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของงานทะวัน

อิชสิกิรินหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

**Growth and Yield Response of Sunflower
(Helianthus annuus L.) to Nitrogen and Plant**

Densities

Author Mr.Chatchavijk Thanomthin

M.S. Agriculture (Agronomy)

Examining Committee	Assoc.Prof.Chalermpone Sampet	Chairman
	Assist.Prof.Dr.Sunthorn Buranaviriyakul	Member
	Assist.Prof.Dr.Suchart Jiraporncharoen	Member
	Lecturer Phrek Gypmantasiri	Member

Abstract

The effects of nitrogen and plant density on growth and yield of a hybrid sunflower (cv. AS540) was investigated at the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University in December 1987. Experimental design was split plot with four levels of nitrogen (0, 8, 16 and 24 kg.N/rai) as main plot and three plant densities (3200, 6400 and 12800 plants/rai) as sub-plot. The results revealed that seed yield increased with increased in nitrogen supply. The average seed yields were 410, 440, 487 and 494 kg./rai corresponding to 0, 8, 16 and 24

kg./rai of nitrogen supply. The positive response of yield was associated with increased in dry matter and leaf area index. Besides, percent protein also increased positively with nitrogen levels, but plant height, stem diameter, yield components (head size, number of seeds per head and 100 seed weight) and percent oil showed no significant difference. Plant density produced 394, 488 and 492 kg./rai of seed yield, respectively. The increase in yield was attributed to increasing plant population rather than yield per plant. Increased plant density increased plant height but decreased stem diameter and yield components. Percent oil and protein showed no response to plant density. There was no significant interaction between nitrogen and plant density for any character measured.