

บทที่ 6

สรุปผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาผลของอาหารขี้นและอาหารขันผสมน้ำต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพชาก และเนื้อของสูกรุ่นและสูกรุน สรุปได้ดังนี้

1. สูกรุ่นน้ำหนัก 30-60 กิโลกรัม ควรได้รับอาหารขันแห่น้ำ 2 ชั่วโมง อัตราส่วนของน้ำต่ออาหารคือ 1:1 สูกรจะมีสมรรถภาพการผลิตดีที่สุด
2. สูกรุนน้ำหนัก 60-90 กิโลกรัม ควรได้รับอาหารขันผสมน้ำในอัตราส่วน 1:3 จะทำให้สูกรมีสมรรถภาพการผลิตดีที่สุด
3. สูกรุ่น-ชุนน้ำหนัก 30-90 กิโลกรัม ควรได้รับอาหารขันแห่น้ำ 2 ชั่วโมง อัตราส่วนของน้ำต่ออาหารคือ 1:1 สูกรจะมีสมรรถภาพการผลิตดีที่สุด
4. สูกรเพคผู้ตอนมีสมรรถภาพการผลิตสูงกว่าสูกรเพคเมีย
5. คุณภาพชากและเนื้อของสูกรที่ได้รับอาหารขันและอาหารขันผสมน้ำไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

การเลี้ยงสูกรุนในสภาพเมืองร้อนอย่างประเทศไทย ควรให้อาหารขันผสมน้ำในอัตราส่วน 1:1 ทึ่งไว้ 2 ชั่วโมงหรือผสมน้ำแล้วให้กินทันทีในอัตราส่วน 1:3 สูกรจะมีสมรรถภาพการผลิตดีกว่าเลี้ยงสูกรุนโดยการให้อาหารขัน(แห้ง)