

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ลักษณะและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้มีคินบางชนิด

ชื่อผู้เขียน

นางสาววชรากรณ์ ชนะเงน

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกยต稻ศาสตร) พืชสวน

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ อาภาวัชรุต์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ไสรยะ ร่วมรังษี กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาลักษณะกล้วยไม้มีคินครั้งนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีการเจริญของหัวเป็นแบบ corm อยู่บนดิน ได้แก่ *Phaius tankervilleae* (Banks ex I' Heritier) Blume (เอียงพร้าว) และ *Eulophia andamanensis* Rchb. f. (ช้างพสมโภลง) กล้วยไม้ในกลุ่มนี้ ในเป็นใบเดียว มีการเรียงตัวของใบแบบสลับ และมีเม็ดจำนานวนมาก สีครีม แต่เอียงพร้าวมีดอกสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่ $6.5-8.5 \times 9.5-11$ ซม ในขณะที่ช้างพสมโภลงมีสีเขียวอมน้ำตาลขนาด $2-2.5 \times 2.5-3$ ซม กลุ่มที่ 2 มีการเจริญของหัวอยู่ใต้ดิน ได้แก่ *Habenaria rhodocheila* Hance (ถิ่นมังกร) และ *Habenaria malintana* (Blanco) Merrill (อ้วนสุเทพ) มีใบเป็นใบเดียว มีการเรียงตัวของใบแบบเวียน และมีเม็ดจำนานวนมาก สีน้ำตาล แต่ถิ่นมังกรมีดอกสีชมพู มีปากขนาดใหญ่ และเดือยดอกขาวเป็นลักษณะเด่น ในขณะที่อ้วนสุเทพมีดอกสีขาวกลืนกับใบและปากแคน กล้วยไม้ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะที่เหมือนกันคือ มีรากเป็นระบบ rak ฝอย มีช่องดอกเป็นแบบช่องระจะ ก้านช่อตั้งตรง ดอกสมมาตร ด้านข้าง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ และกลีบปาก 1 กลีบ ผลมีลักษณะรูปขอบขนาน เป็นผลแบบแห้งแล้วแตก

กล้วยไม้ทั้ง 4 ชนิด มีรูปแบบวงจรการเจริญเติบโตเหมือนกัน ใน 1 วงจรประกอบด้วย การเจริญในระยะเจริญทางด้านลำต้น ระยะสืบพันธุ์ และระยะพักตัว ยกเว้นในเอียงพร้าวมีการพักตัวไม่ชัดเจน การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นจนความสูงคงที่ของแต่ละชนิดแตกต่างกัน เอียงพร้าวและช้างพสมโภลงเริ่มต้นเจริญในเดือนพฤษภาคม และกุมภาพันธ์ ตามลำดับ และมี

ความสูงคงที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมเหมือนกัน ส่วนลินมังกร และอ้วนสุเทพมีการเริ่ญเริ่มนั่นในปลายเดือนมีนาคม และกล่างเดือนเมษายนความสูงคงที่ตั้งแต่เดือนกันยายน และพฤษจิกายน ตามลำดับ

การพัฒนาติดอกเริ่มจาก การหันตาดูกองค์วัยตามไป ซึ่งการศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาของตาในระยะนี้ พบร่วมกับการหันตาดูกองค์วัยเนื้อเยื่อเริ่ญปลายยอด ที่สามารถพัฒนาจนถึงระยะเป็นดอกอ่อนที่มีส่วนประกอบของกองค์พัฒนาครบ ในอี็องพร้าวใช้เวลา 12 สัปดาห์ และ 5-14 และ 17 สัปดาห์ ในช่วงผสมโขลง ลินมังกร และ อ้วนสุเทพ ตามลำดับ การเกิดส่วนประกอบของกองค์เริ่มเกิดจากกลีบ nok กกลีบดอก กกลีบปาก เส้าเกสร และเนื้อเยื่อก้านเกรสรเพคผู้ และเพคเมียตามลำดับ

ความเข้มข้นของชาตุอาหารในส่วนต่างๆ ของพืชทั้ง 4 ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดกลีบไม่มี ระยะการเริ่ญเติบโต และการพัฒนาของกลีบไม่มีแต่จะชนิด โดยระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดคือ ระยะที่มีการเริ่ญของยอดใหม่ หรืออวัยวะใหม่ของพืช เช่น ตา ดอก และราก โดยมีความเข้มข้นของชาตุอาหารในราก หัวเก่า และใบ ลดลง และลดลงอย่างมากในระยะการเริ่ญทางด้านสืบพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแป้ง และน้ำตาล เป็นไปในทิวนองเดียวกัน แต่ความเข้มข้นของแป้งมีการลดลงอย่างรวดเร็วในระยะที่เกิดหน่อใหม่ หลังจากผ่านระยะพักตัว

การศึกษาผลของสารละลายชาตุอาหารต่อการเจริญของกลีบไม่คิน 2 ชนิดประกอบด้วยในโตรเจน ที่ระดับ 100 และ 200 มก/ล ฟอสฟอรัส 50 และ 70 มก/ล และโพแทสเซียม ที่ระดับ 100:200 และ 300 มก/ล ในโตรเจน:ฟอสฟอรัส:โพแทสเซียม ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อความสูงต้น ความกว้าง และความยาวใบ จำนวนใบ จำนวนหน่อ และความสูงของหน่อใหม่ของอี็องพร้าวอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีผลทำให้ความกว้างหัวแตกต่างกัน โดยในโตรเจน:ฟอสฟอรัส:โพแทสเซียม ที่ระดับ 200:70:100 และ 200:70:200 มก/ล ทำให้อี็องพร้าwmีความกว้างหัวมากที่สุด ส่วนความเข้มข้นของ ในโตรเจน:ฟอสฟอรัส:โพแทสเซียม ที่ระดับ 200:50:200 และ 200:70:200 มก/ล มีผลทำให้จำนวนแปอร์เซ็นต์ต้นที่เกิดช่อดอกมากที่สุด สำหรับลินมังกร ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของหัว 3 ชาตุ ไม่มีผลทำให้ความสูงต้น ความยาวใบ จำนวนใบ และ ความกว้างและความยาวของหัวใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีผลทำให้ความกว้างใบ และจำนวนหัวใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยความเข้มข้นของ ในโตรเจน:ฟอสฟอรัส:โพแทสเซียมที่ระดับ 100:70:200 มก/ล ให้ความกว้างใบมากที่สุด และความเข้มข้นที่ระดับ 200:70:300 มก/ล ให้จำนวนหัวมากที่สุด และผลของความเข้มข้น ในโตรเจน:ฟอสฟอรัส:โพแทสเซียม ที่ระดับ 200:70:100 มก/ล ให้แปอร์เซ็นต์ต้นที่เกิดช่อดอกมากที่สุด

Thesis Title Characteristics, Growth and Development of Some Terrestrial Orchids

Author Miss Watcharaporn Chanaken

Degree Master of Science (Agriculture) Horticulture

Thesis Advisory Committee

Assoc. Prof. Dr. Pimchai Apavatjrut Chairperson

Assoc. Prof. Dr. Soraya Ruamrungsri Member

Abstract

The terrestrial orchids in this study could be separated into two groups. The first group has cormous pseudobulb growing on soil surface, i.e. *Phaius tankervilleae* (Banks ex I' Heriter) Blume and *Eulophia andamanensis* Rchb. f.. Both orchids in this group have simple leaves with alternate phyllotaxis and numerous cream seeds. But *P. tankervilleae* has big reddish brown flower, 6.5-8.5×9.5-11 cm in size; whereas *E. andamanensis* has brownish green flower, 2-2.5×2.5-3 cm in size. The second group has tuber growing under ground, i.e. *H. rhodocheila* and *H. malintana*. Both orchids have simple leaves, spiral phyllotaxis and numerous brown seeds. But *H. rhodocheila* has pink flower with outstanding lip and long spur, whereas *H. malintana* has white flower with narrow sepals, petals, and lip. The similar characteristics of these two groups are fibrous root system, racemic and erect inflorescence, complete bilateral symmetry flower having 3 sepals, 2 petals and 1 lip. Both have oblong fruits of capsule type.

The study of their growth cycles showed that all the species had similar growth patterns. In one growth cycle comprised vegetative growth, reproductive growth and dormancy period. Only *P. tankervilleae* had no obvious dormancy period. Growth interms of constant plant height varied among species. *P. tankervilleae* and *E. andamanensis* started to grow in May and February, respectively; constant growth of both species was obtained from

October. *H. rhodocheila* and *H. malintana* started to grow in late March and mid April, respectively. Constant heights occurred from September and November, respectively.

Under histological study flower bud development when first visually noticed, still showed shoot meristematic dome which later developed into young flowers with complete organs. The processes required 12 weeks in *P. tankervilleae*, and 5, 14 and 17 weeks in *E. andamanensis*, *H. rhodocheila*, and *H. malintana*, respectively. Flower organogenesis started in series of development: sepal, petal, lip, column and rostellum.

Mineral concentration varied in different plant parts of the four species. The concentration fluctuation occurred every month. The changing degree depended on plant species and their stages of growth and development. The obvious changes of mineral concentrations occurred during the development of new shoot or new organs e.g. bud, flower, and root. Mineral concentrations in previous-year pseudobulb, root, and leaf decreased, rapid decrease was found in reproductive growth. Similar decreases occurred with starch and sugar, obvious change of starch concentration occurred during the development of new shoot after dormancy period.

The effects of plant nutrients on two terrestrial orchids growth, N at 100 and 200 mg/l combined with P at 50 and 70 mg/l, and K at 100 200 and 300 mg/l were studied. The interactions of various N P K concentrations had no significant effects on plant height, leaf width and leaf length, leaf number, new shoot number and shoot height. However N:P:K at 200:70:100 mg/l and 200:70:200 mg/l provided the most corm width. But N:P:K at 200:50:200 mg/l and 200:70:200 mg/l gave the highest percentage of plants producing inflorescences in *P. tankervilleae*. In *H. rhodocheila* the interaction of N P K concentrations only had the effects on leaf width and new tuber number. The N:P:K concentrations at 100:70:200 mg/l gave the best leaf width, and at 200:70:300 mg/l provided the highest new tuber number, whereas the effect of N:P:K concentration at 200:70:100 mg/l gave the highest percentage of flowering plants.