

## บทที่ 4

### ผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 ศึกษาความสามารถของเชื้อรา *Beauveria bassiana* ต่อเห็บโคระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจนอัม เห็บระยะตัวอ่อน และไข่เห็บในห้องปฏิบัติการ

4.1.1 การศึกษาไอโซเลทของเชื้อรา *B. bassiana* ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทำลายเห็บตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจนอัม ในห้องปฏิบัติการ

เห็บโคเพศเมียที่ดูดเลือดจนอัม ที่ทำการทดสอบโดยการจุ่มเห็บโคลงในสารแขวนลอยสปอร์เชื้อรา *B. bassiana* จำนวน 12 ไอโซเลทที่ระดับความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. พบว่าเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลท 5082 และ 5335 มีความสามารถทำให้เห็บเพศเมียตายได้สูงกว่าทุกกลุ่ม ( $p < 0.05$ ) คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ  $98.33 \pm 1.67$  ตามลำดับ รองลงมา คือ ไอโซเลท 2637, 4591, 5736, 6241, 7683 และ 7757 ส่วนไอโซเลท 6988 ทำให้เห็บเพศเมียที่ดูดเลือดจนอัมมีอัตราการตายต่ำที่สุด (ร้อยละ  $45.00 \pm 5.00$ ) แต่ไม่แตกต่างกับไอโซเลท 5436 และ 6966 ( $p > 0.05$ ) (ตาราง 4-1) (ภาพ 4-1)

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า เห็บเพศเมียที่ดูดเลือดจนอัม หลังจากสัมผัสกับเชื้อรา *B. bassiana* ไปแล้ว 15-21 วัน มีการวางไข่ และไข่เห็บจากเห็บที่ติดเชื้อราไอโซเลท 5082 และ 5335 เกิดการติดเชื้อราตามไปด้วย (ภาพ 4-2) ส่วนไข่เห็บจากเห็บเพศเมียที่สัมผัสเชื้อราไอโซเลทอื่นๆ ไม่พบการติดเชื้อรา ซึ่งสอดคล้องกับ เทอดไทย (2552) ที่พบว่า เมื่อใช้เชื้อร่ากำจัดแมลงจำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ *M. anisopliae*, *M. flavoviride* และ *P. fumosoroseus* สามารถลดจำนวนไข่ของเห็บโคได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ( $p < 0.01$ ) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยเชื้อรา *P. fumosoroseus* ลดจำนวนไข่ได้มากที่สุด (ร้อยละ 52.28) รองลงมา คือ *M. anisopliae* ไอโซเลท 4849 (ร้อยละ 42.27) และยังพบว่า *M. anisopliae* ไอโซเลท 5799 สามารถเข้าทำลายไข่เห็บโคได้ สอดคล้องกับ Samsinako et al. (1974) ซึ่งรายงาน ว่าเห็บ (*I. ricinus*) ระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจนอัมที่ติดเชื้อรา *B. tenella* จากธรรมชาติมี

ความล้มเหลวในการวางไข่ โดยจำนวนไข่ และอัตราการฟักออกของไข่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

นอกจากเชื้อรา *B. bassiana* แล้ว ได้มีการศึกษาเชื้อร่ากำจัดแมลงสายพันธุ์ต่างๆ ในการทำลายเห็บโค โดยไพลิน และคณะ (2551) ได้ทำการทดสอบความสามารถในการทำให้เกิดโรคนกกับเห็บโคเพศเมียที่คัดเลือกจันอิม ของเชื้อร่ากำจัดแมลงจำนวน 6 สายพันธุ์ คือ *B. bassiana*, *M. anisopliae*, *M. flavoviride*, *P. farinosus*, *P. fumosoroseus* และ *V. lecanii* ที่ระดับความเข้มข้น  $5 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. พบว่า มีเชื้อร่ากำจัดแมลง 3 สายพันธุ์ คือ เชื้อรา *B. bassiana*, *M. anisopliae* และ *P. fumosoroseus* ทำให้เห็บสามารถเกิดโรคและตายได้ร้อยละ 100 เชื้อรา *M. flavoviride* และ *V. lecanii* ทำให้เห็บสามารถเกิดโรคและตายได้ร้อยละ 45 และ 81 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) ส่วนเชื้อรา *P. farinosus* ไม่สามารถทำให้เห็บตายได้ สอดคล้องกับทดลองของเทอดไทย (2552) ซึ่งใช้เชื้อร่ากำจัดแมลงจำนวน 3 สายพันธุ์ 9 ไอโซเลท คือ *M. anisopliae* จำนวน 6 ไอโซเลท, *M. flavoviride* จำนวน 2 ไอโซเลท และ *P. fumosoroseus* จำนวน 1 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการทำให้เกิดโรคนกกับเห็บโค ระยะตัวเต็มวัยที่คัดเลือกจันอิม ที่ระดับความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. พบว่า เชื้อร่ากำจัดแมลงทั้ง 3 สายพันธุ์ 9 ไอโซเลท มีความสามารถในการทำให้เห็บ เกิดโรค แต่การตายของเห็บโคแตกต่างกัน ( $p < 0.05$ ) โดยเชื้อรา *M. anisopliae* ไอโซเลท 4849 ทำให้เห็บเกิดโรคและตายได้ถึงร้อยละ 100 แต่ *M. flavoviride* ไอโซเลท 1164 ทำให้เห็บโคเกิดโรคและตายได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 13.33) ส่วน Gindin *et al.* (2001) ทดสอบโดยใช้เชื้อร่ากำจัดแมลง 5 สายพันธุ์ได้แก่ *B. bassiana*, *M. anisopliae*, *M. flavoviride*, *P. fumosoroseus* และ *V. lecanii* ในการควบคุมเห็บ *B. annulatus* ระยะต่างๆ พบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* และ *B. bassiana* มีความรุนแรงในการทำให้เห็บโคเกิดโรคได้มากที่สุด ( $p < 0.05$ ) โดยอัตราการตายของเห็บเพศเมียที่คัดเลือกจันอิมเป็นร้อยละ 85-100 ภายในระยะเวลาเพียง 7-10 วันหลังได้รับเชื้อรา และเชื้อราทั้ง 5 สายพันธุ์ มีผลทำให้เห็บ *B. annulatus* วางไข่ลดลง และ Mwangi *et al.* (1994) ได้นำเชื้อรา *B. bassiana* และเชื้อรา *M. anisopliae* ควบคุมเห็บ *R. appendiculatus* ระยะตัวเต็มวัย พบว่าเชื้อราทั้งสองสายพันธุ์ทำให้เห็บมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 73, 35 และ 0 ตามลำดับ) ( $p < 0.05$ ) ส่วนเห็บเพศเมียที่คัดเลือกจันอิม พบว่าเห็บที่ได้รับเชื้อรา *M. anisopliae* มีอัตราการตายสูงกว่าเชื้อรา *B. bassiana* คิดเป็นร้อยละ 81 และ 74 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) ส่วน Nune *et al.* (2001) ได้ศึกษาเชื้อรา *S. insectorum* และ *P. fumosoroseus* ที่ระดับความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. ในการควบคุมเห็บ *R. appendiculatus* ผลการศึกษาพบว่า เชื้อราทั้งสองสายพันธุ์ทำให้เห็บโคตายร้อยละ 30.19 และ

49.34 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) และยังทำให้อัตราการฟักออกของไข่ลดลงร้อยละ 37.92 และ 79.04 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) เป็นต้น

ตาราง 4-1 อัตราการตายของเห็บเพศเมียที่ดูดเลือดจมนอมนื่องจากเชื้อรา *B. bassiana* แต่ละไอโซเลท

เชื้อรา <i>Beauveria bassiana</i> (ไอโซเลท)	อัตราการตาย (%) $\bar{X} \pm SD$
Bb. 2637	63.33±6.01 <sup>bcd</sup>
Bb. 4591	76.67±4.41 <sup>b</sup>
Bb. 5082	100.00±0.00 <sup>a</sup>
Bb. 5335	98.33±1.67 <sup>a</sup>
Bb. 5436	56.67±8.33 <sup>de</sup>
Bb. 5736	65.00±2.87 <sup>bcd</sup>
Bb. 6241	76.67±1.67 <sup>b</sup>
Bb. 6243	61.67±4.41 <sup>cd</sup>
Bb. 6966	58.33±4.41 <sup>de</sup>
Bb. 6988	45.00±5.00 <sup>e</sup>
Bb. 7683	70.00±2.87 <sup>bcd</sup>
Bb. 7757	75.00±2.87 <sup>bc</sup>


<sup>a, b, c, d, e</sup> อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ )



ภาพ 4-1 ก. เห็นโคเพสเมียที่ดูดเลือดจมนอ้มในกลุ่มควบคุม (20X)

ข. เห็นโคเพสเมียที่ดูดเลือดจมนอ้มที่ถูกเชื้อราไอโซเลต 5082 เข้าทำลายหลังจากการสัมผัสเชื้อรานาน 10 วัน (20X)

ค. เห็นโคเพสเมียที่ดูดเลือดจมนอ้มที่ถูกเชื้อราไอโซเลต 5335 เข้าทำลายหลังจากการสัมผัสเชื้อรานาน 10 วัน (20X)



ภาพ 4-2 ก. ไข่เห็บที่ถูกวางจากเห็บในกลุ่มควบคุม

ข. ไข่เห็บจากเห็บที่ติดเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลต 5335 หลังจากการสัมผัสด้วยเชื้อรานาน 10 วัน (20X)

ค. ไข่เห็บจากเห็บที่ติดเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลต 5082 หลังจากการสัมผัสด้วยเชื้อรานาน 10 วัน (20X)

#### 4.1.2 การศึกษาไอโซเลทของเชื้อรา *B. bassiana* ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทำลายเห็บระยะตัวอ่อน ในห้องปฏิบัติการ

จากการฟ้นเชื้อรา *B. bassiana* จำนวน 12 ไอโซเลท ที่ระดับความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. บนเห็บโคระยะตัวอ่อน พบว่า ไอโซเลท 5335 และ 5082 ทำให้อัตราการตายของเห็บระยะตัวอ่อนสูงที่สุดคิดเป็น ร้อยละ  $92.22 \pm 4.84$  และ  $91.11 \pm 2.94$  ตามลำดับ และมีความแตกต่างจากไอโซเลทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ ) ส่วนอัตราการตายของเห็บระยะตัวอ่อนเนื่องจากเชื้อราไอโซเลท 7683 ต่ำที่สุด (ร้อยละ  $20.00 \pm 1.92$ ) แต่ไม่แตกต่างกับการตายเนื่องจากเชื้อราไอโซเลท 4591, 5436, 6241, 6243, 6966 และ 6988 ( $p > 0.05$ ) (ตาราง 4-2) (ภาพ 4-3)

นอกจากเชื้อรา *B. bassiana* แล้วยังได้มีการศึกษาเชื้อรา *Metarhizium* spp. ต่อการเข้าทำลายเห็บระยะตัวอ่อนโดย Gindin *et al.* (2001) ได้ศึกษาผลของเชื้อรา *M. anisopliae* และ *M. flavoviride* ต่อการทำให้เกิดโรคและตายของเห็บระยะตัวอ่อน พบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* และ *M. flavoviride* ทำให้เห็บระยะตัวอ่อนตายสูงกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 90.6 100 และ 0 ตามลำดับ) ( $p < 0.05$ ) ซึ่งสอดคล้องกับ Lui *et al.* (1989) ได้ทำการทดสอบการเกิดโรคของเห็บ *B. annulatus* ระยะตัวอ่อนเนื่องจาก เชื้อรา *M. anisopliae* ไอโซเลท 7 และ 43 ผลการทดสอบ พบว่า ไอโซเลท 7 ทำให้เห็บตายสูงกว่าไอโซเลท 43 คิดเป็นร้อยละ 100 และ 80 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) นอกจากนี้เห็บ *Boophilus* spp. แล้วยังได้มีการศึกษาเห็บ *Ixodes* spp. โดย Hartelt *et al.* (2007) ได้ทำการทดสอบการเกิดโรคของเห็บ *I. ricinus* ระยะตัวเต็มวัยที่ดูดเลือดจมนอิม ระยะตัวอ่อน และระยะตัวกลางวัย จากเชื้อรา *B. bassiana* และ *M. anisopliae* พบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* ทำให้เห็บ *I. ricinus* ทั้ง 3 ระยะมีอัตราการตายสูงกว่าเชื้อรา *B. bassiana* อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ส่วน Brett *et al.* (2004) ได้ศึกษาการเกิดโรคของเห็บ *R. sanguineus*, เห็บ *D. variabilis* และเห็บ *I. scapularis* ระยะตัวอ่อนเนื่องจากเชื้อรา *B. bassiana* และ *M. anisopliae* ที่ระดับความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. พบว่า ทั้งเชื้อรา *B. bassiana* และ *M. anisopliae* ทำให้ระยะตัวอ่อนของเห็บ *R. sanguineus* มีอัตราการตายที่สูงกว่าเห็บ *D. variabilis* และเห็บ *I. scapularis* อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) โดยเชื้อราทั้งสองสายพันธุ์ทำให้อัตราการตายของเห็บ *R. sanguineus* สูงกว่าร้อยละ 60 ภายใน 14 วัน และสูงกว่าร้อยละ 90 ภายใน 21-28 วัน

นอกจากสกุล สายพันธุ์ และไอโซเลทของเชื้อราที่มีผลต่อการตายของเห็บแล้ว ยังพบว่า ชนิดของสารแขวนลอยสปอร์เชื้อราก็มีผลต่อการตายของเห็บ เช่นการศึกษาของ Gindin *et al.* (2001) ที่ได้ทำการเปรียบเทียบความสามารถในการทำให้เกิดโรคเชื้อรา *B. bassiana* และ *M. anisopliae* ในรูปสารแขวนลอยน้ำกลั่นและสารแขวนลอยน้ำมันความเข้มข้น  $1 \times 10^9$  สปอร์ต่อมล. ต่อตัวอ่อนของเห็บ *R. appendiculatus* และเห็บ *A. variegatum* ผลการทดลองพบว่า เชื้อราทั้งสองสายพันธุ์ในรูปสารแขวนลอยน้ำมันทำให้ตัวอ่อนของเห็บ *R. appendiculatus* และ *A. variegatum* ตายได้ร้อยละ 100 ส่วนเชื้อราในรูปสารแขวนลอยน้ำกลั่น ทำให้ทั้งสองสายพันธุ์ ตายได้เพียงร้อยละ 80 ( $p < 0.05$ )

ตาราง 4-2 อัตราการตายของเห็บตัวอ่อนเนื่องจากเชื้อรา *B. bassiana* แต่ละไอโซเลท

เชื้อรา <i>Beauveria bassiana</i> (ไอโซเลท)	อัตราการตาย (%) $\bar{X} \pm SD$
Bb. 2637	53.33±5.09 <sup>b</sup>
Bb. 4591	35.55±4.01 <sup>bcd</sup>
Bb. 5082	91.11±2.94 <sup>a</sup>
Bb. 5335	92.22±4.84 <sup>a</sup>
Bb. 5436	33.34±3.33 <sup>cd</sup>
Bb. 5736	42.22±11.60 <sup>bc</sup>
Bb. 6241	37.78±4.45 <sup>bcd</sup>
Bb. 6243	34.45±7.78 <sup>cd</sup>
Bb. 6966	28.89±2.94 <sup>cd</sup>
Bb. 6988	45.56±2.94 <sup>cd</sup>
Bb. 7683	20.00±1.92 <sup>d</sup>
Bb. 7757	41.11±5.88 <sup>bc</sup>

<sup>a, b, c, d</sup> อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ )



ภาพ 4-3 ก. เห็นระยะตัวอ่อน ในกลุ่มควบคุม (10X)

ข. เห็นระยะตัวอ่อนที่ถูกเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลท 5082 เข้าทำลายหลังสัมผัสเชื้อรา นาน 10 วัน (10X)

ค. เห็นระยะตัวอ่อนที่ถูกเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลท 5335 เข้าทำลายหลังสัมผัสเชื้อรา นาน 10 วัน (20X)

#### 4.1.3 การศึกษาไอโซเลทของเชื้อรา *B. bassiana* ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทำลายไข่เห็บในห้องปฏิบัติการ

จากการฟ่นเชื้อรา *B. bassiana* จำนวน 12 ไอโซเลท ที่ระดับความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. บนไข่เห็บ เพื่อศึกษาอัตราการฟ่อของไข่เห็บ(ไข่เห็บไม่สามารถฟักออกเป็นตัวอ่อนได้) ผลการศึกษาพบว่า ไอโซเลท 5082 และ 5335 ทำให้ไข่เห็บฟ่อร้อยละ  $98.89 \pm 1.11$  และ  $97.78 \pm 1.11$  ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) และเชื้อรา *B. bassiana* เจริญเติบโตคลุมฟองไข่หลังจากฟ่นเชื้อรา 7-10 วัน (ภาพ 4-4) รองลงมาคือ ไอโซเลท 2637, 4591, 5436, 5736, 6243, 6988 และ 7683 ส่วนไอโซเลท 6241 ทำให้ไข่เห็บฟ่อต่ำที่สุด (ร้อยละ  $27.77 \pm 2.22$ ) (ตาราง 4-3) Kheirabadi *et al.* (2006) ได้ศึกษาผลของเชื้อรา *M. anisopliae*, *B. bassiana* และ *L. psalliotae* ต่ออัตราการฟ่อของไข่เห็บ *R. annulatus* ผลการศึกษาพบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* ทำให้ไข่เห็บไม่สามารถฟักออกเป็นตัวอ่อนได้มากที่สุด (ร้อยละ 88.69) รองลงมาคือ *B. bassiana* (ร้อยละ 78.15) และ *L. psalliotae* มีผลต่อการฟักออกของไข่เห็บต่ำที่สุด (ร้อยละ 59.74) ซึ่งสอดคล้องกับ Gindin *et al.* (2001) ที่ศึกษาเชื้อรา *B. bassiana*, *M. anisopliae*, *M. flavoviride*, *M. fumosoroseus* และ *Verticillium* spp. ต่ออัตราการฟ่อของไข่เห็บ *B. annulatus* ผลการทดสอบพบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* และ *B. bassiana* ทำให้ไข่ฟ่อสูงกว่ากลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 70, 98 และ 0 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) โดยเชื้อรา *B. bassiana* ทำให้ไข่เห็บสามารถฟักออกได้เพียง

ร้อยละ 1.8-6.2 ของไข่เห็บที่ใช้ในการทดสอบ และเชื้อรา *M. anisopliae* ทำให้ไข่เห็บสามารถฟักออกได้เพียงร้อยละ 19.5-30.6 ของไข่เห็บที่ใช้ในการทดสอบ ส่วนเชื้อรา *M. flavoviride*, *M. fumosoroseus* และ *Verticillium* spp. ทำให้อัตราการฟักของไข่เห็บไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม ( $p>0.05$ ) และจากการศึกษาของ Kaaya *et al.* (1996) ที่ศึกษาการฟักออกของไข่เห็บ *Amblyomma variegatum* ในกระต่ายโดยใช้เชื้อรา *B. bassiana* และเชื้อรา *M. anisopliae* ที่ระดับความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. พบว่า อัตราการฟักออกของไข่เห็บในกลุ่มควบคุมและเห็บที่ได้รับเชื้อรา *M. anisopliae* สูงกว่าเห็บที่ได้รับเชื้อรา *B. bassiana* ( $p<0.05$ ) และอัตราการวางไข่ในเห็บที่ได้รับเชื้อรา *B. bassiana* ต่ำกว่าเห็บในกลุ่มควบคุมและเห็บที่ได้รับเชื้อรา *M. anisopliae* อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ ) นอกจากนี้ไข่เห็บแล้ว Lekimme *et al.* (2006) ได้รายงานว่ เชื้อรา *B. bassiana* สามารถทำให้การฟักออกของไข่ไร (*Psoroptes* spp.) ลดลงร้อยละ 90.2 จากการรายงานยังทำให้ทราบว่าเชื้อร่ากำจัดแมลงสามารถควบคุมไรที่เป็นสาเหตุของโรคขี้เรื้อนได้ ส่วน Smith *et al.* (2000) ได้ทดสอบการเกิดโรคและตายของไร (*Psoroptes* spp.) ระยะตัวเต็มวัยเนื่องจากเชื้อรา *H. thompsonii* และ *M. anisopliae* ที่ระดับความเข้มข้น  $1 \times 10^7$  สปอร์ต่อมล. พบว่าเชื้อรา *M. anisopliae* ทำให้ไรระยะตัวเต็มวัยตายได้ ร้อยละ 71 ขณะที่เชื้อรา *H. thompsonii* ไม่สามารถทำให้ไรตายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wall *et al.* (1999) ซึ่งทดสอบไร (*P. ovis*) ระยะตัวเต็มวัยเพศเมียด้วยการพันสารแขวนลอยสปอร์เชื้อร่ากำจัดแมลง *M. anisopliae* ความเข้มข้น  $1 \times 10^7$  สปอร์ต่อมล. พบว่า สามารถทำให้ไรติดเชื้อและเกิดโรคตายได้ถึงร้อยละ 70 และยังสามารถทำให้ไรตายได้ถึงร้อยละ 50 ภายในระยะเวลาเพียง 2-3 วัน และ Brook and Wall (2001) ทดสอบการเกิดโรคของไร (*P. ovis*) เนื่องจากเชื้อรา *M. anisopliae* ความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. พบว่า เชื้อร่าทำให้ไรมีอัตราการตายร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังการพันเชื้อ เช่นเดียวกัน





ภาพ 4-4 ก. ไข่เห็บในกลุ่มควบคุม (20X)

ข. ไข่เห็บที่ถูกเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลต 5335 เข้าทำลายหลังการสัมผัสเชื้อรานาน 10 วัน (20X)

ค. ไข่เห็บที่ถูกเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลต 5082 เข้าทำลายหลังการสัมผัสเชื้อรานาน 10 วัน (20X)

ตาราง 4-3 ไข่เห็บที่ไม่ฟักหรือไข่เห็บฝ่อเนื่องจากเชื้อรา *B. bassiana* แต่ละไอโซเลต

เชื้อรา <i>Beauveria bassiana</i> (ไอโซเลต)	ไข่เห็บที่ไม่ฟักหรือไข่เห็บฝ่อ (%) $\bar{X} \pm SD$
Bb. 2637	47.78±1.11 <sup>bc</sup>
Bb. 4591	51.11±1.11 <sup>bc</sup>
Bb. 5082	98.89±1.11 <sup>a</sup>
Bb. 5335	97.78±1.11 <sup>a</sup>
Bb. 5436	54.44± 2.94 <sup>bc</sup>
Bb. 5736	43.33±12.02 <sup>bc</sup>
Bb. 6241	27.77±2.22 <sup>d</sup>
Bb. 6243	42.22±4.84 <sup>bc</sup>
Bb. 6966	45.56±2.94 <sup>bc</sup>
Bb. 6988	56.67±1.93 <sup>b</sup>
Bb. 7683	44.44±2.94 <sup>bc</sup>
Bb. 7757	41.11±5.87 <sup>c</sup>

<sup>a, b, c, d</sup> อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ )


#### 4.2 การทดสอบความรุนแรงของเชื้อ *B. bassiana* ที่ใช้ควบคุมเห็บในโคระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจนอิ่ม (ค่า $LC_{50}$ ; median lethal concentration และ $LT_{50}$ ; median lethal time)

ผลจากการศึกษาความสามารถของเชื้อรา *B. bassiana* ในการทำให้เห็บเกิดโรคตายจาก 12 ไอโซเลท พบว่า ไอโซเลท 5082 และ 5335 มีความสามารถในการทำให้เห็บเกิดโรคตายสูงที่สุด (ร้อยละ 90-100) จึงได้นำมาศึกษาหาความรุนแรงของเชื้อรา ซึ่งความรุนแรงของเชื้อรานี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นต่ำที่สุดที่ทำให้เห็บตายได้ร้อยละ 50 ( $LC_{50}$ ; median lethal concentration) และและความเร็วของการตาย ( $LT_{50}$ ; median lethal time) ที่ระดับความเข้มข้นของสปอร์แตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่  $1 \times 10^4$ ,  $1 \times 10^6$ ,  $1 \times 10^8$ ,  $1 \times 10^9$  และ  $1 \times 10^{10}$  สปอร์ต่อมล. นับจำนวนเห็บที่ตาย และมีเชื้อราขึ้นปกคลุมไปคำนวณค่า  $LC_{50}$  และค่า  $LT_{50}$  ผลการทดลองพบว่า ค่า  $LC_{50}$  (ตาราง 4-4) (ภาพ 4-5) ของเชื้อรา *B. bassiana* ทั้ง 2 ไอโซเลทแตกต่างกันทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) โดยเชื้อราที่มีความรุนแรงสูงจะมีค่า  $LC_{50}$  ต่ำ ซึ่งได้แก่เชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลท 5335 มีค่า  $LC_{50}$  เท่ากับ  $4.71 \times 10^4$  สปอร์ต่อมล. และเมื่อพิจารณาถึงค่า  $LT_{50}$  (ตาราง 4-5) จะเห็นได้ว่าค่า  $LT_{50}$  ของเชื้อราทั้ง 2 ไอโซเลทแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ซึ่งเชื้อราที่มีค่า  $LT_{50}$  ต่ำจะเป็นเชื้อราที่มีความรุนแรงในการทำให้เห็บเกิดโรคสูง จากผลการทดลองพบว่า ไอโซเลท 5335 ใช้ระยะเวลาในการทำให้เห็บโคตายร้อยละ 50 เพียง 9.98 วัน ในขณะที่ไอโซเลท 5082 ต้องใช้ระยะเวลาถึง 13.39 วัน

ตาราง 4-4 ค่า  $LC_{50}$  (median lethal concentration) ของเชื้อรา *B. bassiana* ที่ใช้ควบคุมเห็บโคระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจนอิ่ม

เชื้อรา <i>B. bassiana</i>	$LC_{50}$ (spore/ml) $\bar{X} \pm SE$	Slope $\bar{X} \pm SE$	Intercept	$\chi^2$
ไอโซเลท 5335	$4.71 \times 10^4 \pm 0.85^a$	$1.80 \pm 0.04^a$	4.09	7.05
ไอโซเลท 5082	$3.06 \times 10^5 \pm 1.44^b$	$1.78 \pm 0.08^b$	4.01	8.51

<sup>a,b</sup> ในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ )



ภาพ 4-5 ก. เห็บโคที่ถูกเชื้อราไอโซเลข 5335 เข้าทำลาย 10 วันหลังจากการสัมผัสเชื้อรา (10X)  
ข. เห็บโคที่ถูกเชื้อราไอโซเลข 5082 เข้าทำลาย 10 วัน หลังจากการสัมผัสเชื้อรา (20X)

ตาราง 4-5 ค่า  $LT_{50}$  (median lethal time) ของเชื้อรา *B. bassiana* ที่ใช้ควบคุมเห็บโค  
ระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจมนอิม

เชื้อรา <i>B. bassiana</i>	$LT_{50}$ (วัน) $\bar{X} \pm SE$	Slope $\bar{X} \pm SE$	Intercept	$\chi^2$
ไอโซเลข 5335	$9.98 \pm 2.38^a$	$1.61 \pm 1.58^a$	6.48	4.57
ไอโซเลข 5082	$13.39 \pm 3.86^b$	$1.29 \pm 0.58^b$	6.52	6.29

<sup>a,b</sup> ในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ )

และจากการศึกษาของ ไพลิน และคณะ (2550) ได้คำนวณหาค่า  $LC_{50}$  และค่า  $LT_{50}$  ของเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลข 6241, *M. anisopliae* ไอโซเลข 6079 และ *P. fumosoroseus* ไอโซเลข 2507 พบว่า *P. fumosoroseus* ไอโซเลข 2507 เป็นเชื้อราที่มีความรุนแรงในการทำให้เห็บโคเกิดโรคและตายสูงกว่าเชื้อรา *M. anisopliae* ไอโซเลข 6079 และเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลข 6241 โดยมีค่า  $LC_{50}$  เท่ากับ  $3.4 \times 10^3$ ,  $2.4 \times 10^4$  และ  $1.7 \times 10^6$  สปอร์ต่อมล. ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) และ ค่า  $LT_{50}$  เท่ากับ  $5.53 \pm 0.09$ ,  $9.25 \pm 0.68$  และ  $11.90 \pm 2.90$  วัน ตามลำดับ ส่วน มาลี และกรกฎ (2552) ได้นำเชื้อรา *M. anisopliae* จำนวน 3 ไอโซเลข คือ 6079 6171 และ 7965 มาหาค่าความรุนแรง ( $LC_{50}$ ) ในการทำให้เห็บโคระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจมนอิมเกิดโรคและตาย พบว่า ไอโซเลข 6079 เป็นเชื้อราที่มีความรุนแรงในการทำให้เห็บโคเกิดโรคและตายสูง

กว่าไอโซเลท 7965 และ 6171 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ส่วน Hartelt *et al.* (2007) ได้นำเชื้อรา *M. anisopliae* ไอโซเลท 97, ไอโซเลท X-1c และไอโซเลท 43 มาหาค่า  $LC_{50}$  พบว่า ไอโซเลท 97 มีค่า  $LC_{50}$  ต่ำที่สุด คิดเป็น  $1.4 \times 10^6$  สปอร์ต่อมล. แสดงว่ามีความรุนแรงของการเกิดโรคมกกว่าเชื้อราไอโซเลทอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) นอกจากการศึกษาความรุนแรง ( $LC_{50}$ ) ในหีบเพศเมียแล้วยังได้มีการหาค่าความรุนแรงในไข่หีบด้วย โดยเทอดไทย (2552) ได้นำเชื้อรา *M. anisopliae* จำนวน 3 ไอโซเลท คือ 4849, 5799 และ 7965 มาคำนวณค่า  $LC_{50}$  ในไข่หีบ ผลการคำนวณพบว่า ไอโซเลท 4849 มีค่า  $LC_{50}$  ต่ำที่สุด ( $8.51 \times 10^0$  สปอร์ต่อมล.) แสดงว่าเป็นไอโซเลทที่มีความรุนแรงสูงในการทำให้ไข่หีบเกิดโรคและฟอรองลงมา คือ ไอโซเลท 7965 ( $3.7 \times 10^1$  สปอร์ต่อมล.) และไอโซเลท 5799 มีความรุนแรงในการทำให้ไข่หีบเกิดโรคและฟอรองต่ำสุด ( $1.7 \times 10^2$  สปอร์ต่อมล.) ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ Monteiro *et al.* (1998) ได้ทดสอบความรุนแรงในการทำให้เกิดโรคของเชื้อรา *M. anisopliae* และเชื้อรา *B. bassiana* ต่อระยะตัวกลางวัยของหีบ *Rhipicephalus sanguineus* พบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* มีค่า  $LC_{50}$  อยู่ในช่วง  $1.3 \times 10^4$ - $4.3 \times 10^6$  สปอร์ต่อมล. และค่า  $LC_{50}$  ของเชื้อรา *B. bassiana* อยู่ในช่วง  $2.2 \times 10^5$ - $1.2 \times 10^6$  สปอร์ต่อมล. ส่วน Bittencourt *et al.* (1996) ได้รายงานค่า  $LC_{50}$  ของเชื้อรา *B. bassiana* เป็น  $6.83 \times 10^6$  สปอร์ต่อมล. (ตาราง 4-6)

ตาราง 4-6 ค่า  $LC_{50}$  (median lethal concentration) และค่า  $LT_{50}$  (median lethal time) ของเชื้อร่ากำจัดแมลงแต่ละสายพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมหีบในโค

เชื้อร่ากำจัดแมลง (สายพันธุ์)	ค่า $LC_{50}$ (สปอร์ต่อมล.)	ค่า $LT_{50}$ (วัน)	อ้างอิง
<i>Beauveria</i> spp.			
<i>B. bassiana</i>	$2.20 \times 10^5$ - $1.20 \times 10^6$		Monteiro <i>et al.</i> (1998)
<i>B. bassiana</i>	$6.38 \times 10^6$		Bittencourt <i>et al.</i> (1996)
<i>B. bassiana</i> 6241	$1.70 \times 10^6$	$11.90 \pm 2.90$	ไพลิน และคณะ (2550)
<i>Metarhizium</i> spp.			
<i>M. anisopliae</i>	$1.30 \times 10^4$ - $4.30 \times 10^6$		Monteiro <i>et al.</i> (1998)


ตาราง 4-6 (ต่อ) ค่า LC<sub>50</sub> (median lethal concentration) และค่า LT<sub>50</sub> (median lethal time) ของเชื้อรากำจัดแมลงแต่ละสายพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมเห็บในโค

เชื้อรากำจัดแมลง (สายพันธุ์)	ค่า LC <sub>50</sub> (สปอร์ต่อมล.)	ค่า LT <sub>50</sub> (วัน)	อ้างอิง
<i>M. anisopliae</i> 4849	1.73x10 <sup>2</sup>		เทอดไทย (2552)
<i>M. anisopliae</i> 6079	2.4x10 <sup>4</sup>	11.90±2.90	มาลี และกรกฎ (2552)
	2.4x10 <sup>4</sup>	9.25±0.68	ไพลิน และคณะ (2550)
<i>M. anisopliae</i> 6171	5.0x10 <sup>5</sup>	6.31±1.94	มาลี และกรกฎ (2552)
<i>M. anisopliae</i> 7965	3.40x10 <sup>4</sup>	5.53±0.09	มาลี และกรกฎ (2552)
<i>M. anisopliae</i> 97	1.40x10 <sup>6</sup>	14	Hartelt <i>et al.</i> (2007)
<i>Paecilomyces</i> spp.			
<i>P. fumosoroseus</i> 2507	3.4x10 <sup>3</sup>	11.90±2.90	ไพลิน และคณะ (2550)

#### 4.3 การศึกษาหลักการเข้าทำลายของเชื้อรา *B. bassiana* ในเห็บระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจนอิม

การเข้าทำลาย และการเจริญเติบโตของสปอร์เชื้อรา *B. bassiana* ในตัวเห็บ จะเริ่มจากสปอร์ของเชื้อรา *B. bassiana* สัมผัสกับผนังลำตัว จากนั้นสปอร์จะงอกส่วนที่เป็นท่อสั้นๆ (germ tube) แทะทะลุผนังลำตัวเข้าไปโดยมี appressoria เป็นส่วนที่ยึดผนังลำตัวแมลงไว้ (Madelin *et al.*, 1967) ลักษณะของ germ tube ในช่วงแรกจะสั้นมาก เมื่อระยะเวลาผ่านไป germ tube เจริญเป็นสายที่ยาวกว่าขึ้น ภายในลำตัวแมลง และจะสร้างเส้นใย (mycelium) เข้าไปตามกระแสเลือด และเพิ่มปริมาณในเลือดอย่างรวดเร็ว โดยที่เส้นใยจะหักออกเป็นท่อนสั้นๆ เข้าทำลายอวัยวะต่างๆ ของเห็บ ภายหลังจากที่เห็บตายหรือก่อนตายเล็กน้อย พบว่า เส้นใยขยายไปจนทั่วลำตัวเห็บ จากนั้นเชื้อราสร้าง conidiphores แทะทะลุออกมาจากลำตัวแมลง และสร้าง conidia ตรงปลายเส้นใย


เก็บตัวอย่างเห็บที่ผ่านการฟ้นด้วยเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลท 5082 และ 5335 ความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์/มล. แช่ลงใน chloral hydrate จนตัวเห็บใส แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เก็บตัวอย่างเห็บทุกๆ 6 ชั่วโมง จนถึง 72 ชั่วโมง ตัวอย่างเห็บในระยะนี้จะย้อมด้วย calcofluor เป็นสีย้อมที่มีลักษณะเป็นเรืองแสงสีฟ้า ระยะที่ 2 เก็บตัวอย่างเห็บทุกวัน นาน 5 วัน โดยเก็บตัวอย่างเห็บต่อจาก 72 ชั่วโมง ตัวอย่างเห็บในระยะนี้จะย้อมด้วย fuchsin acid 0.5% ซึ่งมีสีชมพูเข้ม จากการผลการศึกษา พบว่า เชื้อรา *B. bassiana* ทั้ง 2 ไอโซเลทมีความสามารถในการเข้าทำลายเห็บได้ภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ ในชั่วโมงที่ 6 ของการศึกษา พบว่า สปอร์ของเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลท 5082 และ 5335 เริ่มงอกส่วนที่เป็น germ tube (ภาพ 4-6) ระยะนี้ germ tube มีลักษณะเป็นท่อหรือเส้นสั้นๆ กระจายอยู่ทั่วไป และชั่วโมง 12 เริ่มเห็น germ tube พัฒนาเป็นสายที่ยาวขึ้น และเริ่มพันทับกัน และสร้างเส้นใยแพร่กระจายไปทั่วตัวแมลง และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว (ภาพ 4-7)



ภาพ 4-6 ผนังลำตัวของเห็บโคถูกย้อมด้วย calcofluor ในชั่วโมงที่ 6

ก. ลักษณะสปอร์ และ germ tube ของไอโซเลท 5082 ในตัวเห็บ (100X)

ข. ลักษณะสปอร์ และ germ tube ของไอโซเลท 5335 ในตัวเห็บ (100X)




ภาพ 4-7 ผนังลำตัวของเห็บโคถูกย้อมด้วย calcofluor ในชั่วโมงที่ 12

ก. ลักษณะสปอร์ และ germ tube ของไอโซเลต 5082 ในตัวเห็บ (100X)

ข. ลักษณะสปอร์ และ germ tube ของไอโซเลต 5335 ในตัวเห็บ (100X)


ระยะที่ 2 ของการศึกษาพบว่า การเจริญเติบโตของสปอร์เชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลต 5082 และ 5335 ในวันที่ 1 เชื้อรามีการสร้าง conidiophores แขนงทะลุออกมาจากลำตัวเห็บ ซึ่งระยะนี้ conidiophores (ก้านชูสปอร์) มีลักษณะเป็นสายสั้น (ภาพ 4-8) และพัฒนาเป็นสายที่ยาวขึ้น และในวันที่ 5 พบ conidia ที่ปลายนั่น (ภาพ 4-9)



ภาพ 4-8 ผนังลำตัวของเห็บโคในวันที่ 1 ถูกย้อมด้วย fuchsin acid 0.5%

ก. conidiophores ของไอโซเลต 5082 แขนงทะลุออกมาจากลำตัวเห็บ (100X)

ข. conidiophores ของไอโซเลต 5335 แขนงทะลุออกมาจากลำตัวเห็บ (100X)



ภาพ 4-9 ผนังลำตัวของเห็บโค ในวันที่ 5 ถูกย้อมด้วย fuchsin acid 0.5%

- ก. conidia ของไอโซเลท 5082 หลังจาก conidiphores แหวงทะลุออกมา  
ลำตัวเห็บ (100X)
- ข. conidia ของ ไอโซเลท 5335 หลังจาก conidiphores แหวงทะลุออกมา  
ลำตัวเห็บ (100X)

#### 4.4 การศึกษาความสามารถเชื้อรา *Beauveria bassiana* ต่อการฟักออกของไข่เห็บในสภาพเลียนแบบธรรมชาติ

จากการศึกษาเชื้อรา *B. bassiana* จำนวน 2 ไอโซเลทที่เลี้ยงไว้ในข้าวฟ่าง ต่อการฟักออกของไข่เห็บ (*Boophilus microplus*) ในสภาพเลียนแบบธรรมชาติ โดยทำให้ไข่เห็บสัมผัสกับเชื้อรา *B. bassiana* ที่เลี้ยงไว้บนวัสดุเลี้ยงเชื้อรา จากนั้นบันทึกอัตราการฟักออกของไข่เห็บหลังจากใส่เชื้อราไปแล้ว 15 วัน (ช่วงระยะเวลาไข่ฟักออกเป็นเห็บระยะตัวอ่อนประมาณ 15-23 วัน) หรือนานจนกว่าไข่เห็บไม่มีการฟักออกเป็นตัวอ่อนเพิ่ม ผลการศึกษาพบว่า เชื้อรา *B. bassiana* ทั้ง 2 ไอโซเลทมีผลต่อการฟักออกของไข่เห็บ (ภาพ 4-10) แต่อัตราการฟักออกของไข่เห็บแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) โดยไอโซเลท 5335 ทำให้ไข่เห็บไม่ฟักออกเป็นตัวอ่อน (ไข่เห็บฝ่อ) ได้สูงกว่าไอโซเลท 5082 และ กลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 94.00, 76.72 และ 0 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) (ตาราง 4-7)

และเมื่อศึกษาอัตราการตายของเห็บโคระยะตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่เห็บที่ทดสอบด้วยเชื้อรา *B. bassiana* พบว่า เห็บระยะตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่เห็บที่ติดเชื้อราในไอโซเลท 5082 และ





5335 มีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 99.32, 94.22 และ 0 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) (ตาราง 4-7) (ภาพ 4-11) ซึ่งสอดคล้องกับ Posdas and Lecuona (2008) ที่ได้ศึกษาไอโซเลทของเชื้อรา *B. bassiana* ต่อการควบคุมเห็บ *R. microplus* พบว่า เชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลท 259 และ ไอโซเลท 98 สามารถทำให้จำนวนไข่และจำนวนตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่จากเห็บที่ติดเชื้อราทั้ง 2 ไอโซเลท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ส่วน Kaaya *et al.* (1996) ได้นำเชื้อรา *M. anisopliae* ที่ระดับความเข้มข้น  $10^8$  สปอร์ต่อมล. ทดสอบกับเห็บ *A. variegatum* ระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจมนอิม เพื่อศึกษาถึงจำนวนไข่ที่วางและอัตราการฟักออกของไข่ พบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* ทำให้จำนวนไข่ที่วางลดลงร้อยละ 4 ( $p < 0.05$ ) ส่วนอัตราการฟักออกของไข่ พบว่า การฟักออกของไข่ในกลุ่มควบคุมสูงกว่าไข่ที่เกิดจากเห็บที่ได้รับเชื้อรา *M. anisopliae* คิดเป็นร้อยละ 100 และ 68 ตามลำดับ และ Kheirabadi *et al.* (2006) ได้ศึกษาเชื้อรา *M. anisopliae*, *B. bassiana* และ *L. psalliotae* ความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. ต่อการฟักออกของไข่เห็บ *R. annulatus* พบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* ทำให้ไข่เห็บ *R. annulatus* ไม่สามารถฟักออกเป็นตัวอ่อนได้มากที่สุด (ร้อยละ 88.69) รองลงมา คือ เชื้อรา *B. bassiana* (ร้อยละ 78.15) และเชื้อรา *L. psalliotae* ทำให้ไข่เห็บไม่สามารถฟักออกเป็นตัวอ่อนต่ำที่สุด (ร้อยละ 59.74)

ตาราง 4-7 ไข่เห็บที่ไม่ฟัก(ไข่เห็บฝ่อ) และอัตราการตายของเห็บระยะตัวอ่อน

กลุ่มทดลอง	ไข่เห็บที่ไม่ฟัก (%)	อัตราการตายของเห็บระยะตัวอ่อน (%)
	$\bar{X} \pm SD$	$\bar{X} \pm SD$
กลุ่มควบคุม	0.00±0.00 <sup>c</sup>	00.00±0.00 <sup>b</sup>
Bb. 5082	75.67±2.84 <sup>b</sup>	94.22±2.23 <sup>a</sup>
Bb. 5335	94.00±4.58 <sup>a</sup>	99.32±0.68 <sup>a</sup>

<sup>a,b,c</sup> ในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ )



ภาพ 4-10 ก. ไข่เห็บ และการเจริญเติบโตของเชื้อรา *B. bassiana* วันที่ 6 ของการทดสอบ (10X)  
 ข. ไข่เห็บ และการเจริญเติบโตของเชื้อรา *B. bassiana* วันที่ 10 ของการทดสอบ (10X)



ภาพ 4-11 ก. ตัวอ่อนเห็บโคที่ถูกเชื้อรา *B. Bassiana* ไอโซเลต 5335 เข้าทำลายวันที่ 3  
 ของการฟักออก (20X)  
 ข. ตัวอ่อนเห็บโคที่ถูกเชื้อรา *B. Bassiana* ไอโซเลต 5082 เข้าทำลายวันที่ 3  
 ของการฟักออก (20X)

#### 4.5 การศึกษาเชื้อรา *B. bassiana* ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทำลายเห็บตัวเต็มวัยบนตัวโค

จากการศึกษาเชื้อรา *B. bassiana* ไอโซเลท 5082 และ 5335 ในการทำลายเห็บตัวเต็มวัยบนตัวโค โดยพ่นสารแขวนลอยสปอร์เชื้อราความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. ปริมาณ 10 มล. ลงใบหูโคที่มีเห็บตัวเต็มวัยเพศเมีย เกาะอยู่ โดยหุ้กข้างพ่นด้วยน้ำกลั่น ปริมาณ 10 มล. และติดตามดูการตายของเห็บนาน 14 วัน พบว่า เห็บเพศเมียเริ่มตายหลังจากพ่นด้วยเชื้อรา *B. bassiana* ไปแล้ว 4-13 วัน จากนั้นนำเห็บที่ตายได้ลงในจานเลี้ยงเชื้อที่มีกระดาษกรองรองอยู่ทั้ง 2 ด้าน และนำไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ เพื่อดูว่ามีเชื้อราเจริญขึ้นปกคลุมตัวเห็บหรือไม่ เพื่อยืนยันว่าเป็นการตายจากเชื้อราที่ใช้ทดสอบจริง (เชื้อรา *B. bassiana* จะเป็นเส้นใยสีขาว) ซึ่งจะเห็นเชื้อราขึ้นปกคลุมลำตัวเห็บหลังจากเห็บตายไปแล้ว 10 วัน (ภาพ 4-12) และอัตราการตายของเห็บเนื่องจากเชื้อราทั้ง 2 ไอโซเลทแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) (ตาราง 4-8) โดยอัตราการตายของเห็บตัวเต็มวัยเนื่องจากไอโซเลท 5335 สูงกว่าไอโซเลท 5082 และกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ  $99.55 \pm 0.30$ ,  $93.74 \pm 1.18$  และ  $11.60 \pm 0.60$  ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) ได้มีการศึกษา พบว่า เชื้อราที่นิยมใช้เพื่อควบคุมเห็บ คือ เชื้อราในสกุล *B. bassiana* และ *M. anisopliae* เนื่องจากเชื้อราทั้งสองสายพันธุ์นี้สามารถแพร่กระจายได้ในหลายภูมิประเทศแม้แต่ในสภาพที่มีความชื้นต่ำ และมีผลต่อเห็บหลายชนิด รวมทั้งสามารถทำลายไข่ของเห็บได้ (Garcia *et al.*, 2005) Camposs *et al.* (2005) ได้รายงานไว้ว่า เชื้อรา *B. bassiana* เป็นเชื้อร่ากำจัดแมลงในวงกว้างที่สามารถนำมาควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยในเชื้อรา *B. bassiana* และเชื้อรา *B. amorphas* มีเอนไซม์ Proteases และเอนไซม์ Chitinases ที่ช่วยย่อยผนังลำตัวของแมลงศัตรูพืช ทำให้เชื้อราทั้ง 2 ชนิดเข้าทำลายแมลงเป้าหมายและเกิดโรคกับแมลงเป้าหมายได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ Kaaya *et al.* (1996) ได้ศึกษาความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อรา *B. bassiana* และ *M. anisopliae* กับเห็บโค โดยใช้โคพันธุ์ Zebu จำนวน 5 ตัว ผูกถุงในลอนที่บรรจุเห็บ *R. appendiculatus* จำนวน 50 ตัวต่อถุง โดยมีคั้งหูซ้ายและหูขวา จากนั้นพ่นด้วยสารแขวนลอยสปอร์เชื้อราความเข้มข้น  $10^9$  สปอร์ต่อมล. พบว่า เชื้อรา *M. anisopliae* และ *B. bassiana* ทำให้อัตราการตายของเห็บสูงกว่ากลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 83.0, 77.5 และ 17.0 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) และ Samsinako *et al.* (1974) ยังได้ทำการทดสอบ โดยพ่นสารแขวนลอยเชื้อรา *B. bassiana* และเชื้อรา *M. anisopliae* ความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. บนเห็บ *R. appendiculatus* ระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจนวนอิมที่เกาะบนตัวโค และเห็บ *R. appendiculatus* ระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่ดูดเลือดจนวนอิมที่เกาะบนตัวโคตาย พบว่า เห็บที่เกาะบน

ตัวโคหลังจากการปนสารแขวนลอยสปอร์เชื้อราทั้งสองสายพันธุ์ มีอัตราการตายสูงกว่าเห็บที่เกาะบนกระต่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) ส่วน Polar *et al.* (2005) ได้ศึกษาความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อรา *M. anisopliae* ไอโซเลท ARSEF3297 และ IMI386697 ต่อเห็บ *B. microplus* บนตัวโค โดยใช้ความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. ผลการศึกษา พบว่า ไอโซเลท ARSEF3297 และ IMI386697 ทำให้เห็บ *B. microplus* เกิดโรคและตายได้สูงกว่ากลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 89, 29 และ 0 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) ส่วน Gindin *et al.* (2001) ได้ทดสอบความสามารถในการเกิดโรคในเห็บ *B. decoloratus* บนตัวโคพบว่า ทั้งเชื้อรา *B. bassiana* และเชื้อรา *M. anisopliae* ทำให้อัตราการตายของเห็บสูงกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 40, 50 และ 0 ตามลำดับ) ( $p < 0.05$ ) และในไขพบว่ามีเชื้อรา *B. bassiana* และเชื้อรา *M. anisopliae* ทำให้ไขเห็บลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (ร้อยละ 30, 50 และ 98 ตามลำดับ) ( $p < 0.05$ ) นอกจากนี้ Gindin *et al.* (2001) ยังได้ทดลองในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยการปนสารแขวนลอยสปอร์เชื้อรา *B. bassiana* และเชื้อรา *M. anisopliae* ความเข้มข้น  $1 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. พบว่าหลังจากปนเชื้อรา *B. bassiana* และ *M. anisopliae* ไปแล้ว 6 เดือน จำนวนเห็บ *R. appendiculatus* บนตัวโคลดลงร้อยละ 80 และ 92 ตามลำดับ ( $p < 0.05$ ) และ Leemon and Jonsson (2008) ได้รายงานว่าการใช้เชื้อรา *M. anisopliae* ไอโซเลท BN101C-2 ความเข้มข้น  $3 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. ในส่วนผสมของน้ำมันเปรียบเทียบกับน้ำกลั่น พบว่าการใช้น้ำมันมีผลทำให้เห็บโคตายได้ร้อยละ 100 ภายใน 2 วัน ส่วนการใช้น้ำกลั่นทำให้เห็บโคตายได้ร้อยละ 100 ภายใน 5 วัน น้ำมันมีข้อดีคือ สามารถยึดเกาะลำตัวเห็บ และยึดอายุสปอร์เชื้อร่ากำจัดแมลงได้ดีกว่าน้ำกลั่น ซึ่งสอดคล้องกับ Maranga *et al.* (2005) ได้เปรียบเทียบเกิดโรคของเห็บ *A. variegatum* พบว่า เห็บที่ปนด้วยสารแขวนลอยสปอร์เชื้อร่ากำจัดแมลงในน้ำมันมีอัตราการตายสูงกว่าเห็บที่ปนด้วยสารแขวนลอยสปอร์เชื้อร่ากำจัดแมลงในน้ำกลั่น คิดเป็นร้อยละ 94 และ 49 ตามลำดับ นอกจากนี้ Rath *et al.* (1990b) ได้ศึกษาถึงการคงอยู่ของสปอร์เชื้อรา *B. bassiana* และเชื้อรา *M. anisopliae* ในทราย โดยเก็บสปอร์ของเชื้อราทั้งสองไว้ในอุณหภูมิห้อง พบว่า สปอร์ของเชื้อรา *B. bassiana* สามารถอยู่ได้นานถึง 12 เดือน ส่วนสปอร์ของเชื้อรา *M. anisopliae* สามารถอยู่ได้เพียง 8-9 เดือนเท่านั้น

ตาราง 4-8 อัตราการตายของเห็บเพศเมียที่คัดเลือกจมน้ำจืดบนตัวโคเนื่องจากเชื้อรา *Beauveria bassiana*

กลุ่มทดลอง	อัตราการตาย (%)	
	$\bar{X}$	$\pm$ SD
น้ำกลั่น (กลุ่มควบคุม)	11.60	$\pm 0.60^c$
เชื้อรา <i>Beauveria bassiana</i> 5082	93.74	$\pm 1.18^b$
เชื้อรา <i>Beauveria bassiana</i> 5335	99.55	$\pm 0.30^a$

<sup>a,b,c</sup> ในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p < 0.05$ )



ก.



ข.



ค.

ภาพ 4-12 ก. เห็บโคในกลุ่มควบคุม (10X)

ข. เห็บโคหลังจากทดสอบด้วยเชื้อรา *B. Bassiana* ไอโซเลท 5082 นาน 10 วัน (20X)

ค. เห็บโคหลังจากทดสอบด้วยเชื้อรา *B. Bassiana* ไอโซเลท 5335 นาน 10 วัน (20X)

นอกจากการศึกษาการทำให้เกิดโรคของเชื้อร่ากำจัดแมลงในเห็บโคแล้ว มาลี และกรกฎ (2552) ได้ทำการศึกษาสุขภาพโคหลังการพ่นด้วยเชื้อรา *M. anisopliae* ความเข้มข้น  $5 \times 10^8$  สปอร์ต่อมล. ที่บริเวณสวาปด้านซ้ายของโคจำนวน 3 ตัว เก็บตัวอย่างเลือด และตัวอย่างผิวหนังตรงบริเวณที่พ่นเชื้อรา ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความเปลี่ยนแปลงของค่าโลหิตวิทยา หลังจากการพ่นเชื้อรานาน 3 สัปดาห์ และเมื่อศึกษาผลที่มีต่อลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของผิวหนังก็ไม่พบความผิดปกติของผิวหนังโคแต่อย่างใด



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved