

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ บุคลิกภาพของผู้เสพยาบ้าที่มารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัด
รักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน นางสาวจิตาภา พวงเพชร

สาขารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี	ปัทมพันธ์ุ	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์พัฒนา	สุจำนงค์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรिता	ธีระวัฒน์สกุล	กรรมการ
อาจารย์ธีระรัตน์	บริพัณกุล	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของผู้เสพยาบ้าที่มารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งลักษณะข้อมูลด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม และประวัติการเสพยาบ้า ตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 165 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบวัดบุคลิกภาพ เอ็มพีไอ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพของผู้เสพยาบ้าส่วนใหญ่ มีบุคลิกภาพด้านพฤติกรรมเป็นแบบปานกลางร้อยละ 70.9 รองลงมาเป็นแบบเก็บตัวร้อยละ 21.8 และที่น้อยที่สุดคือแบบแสดงออกร้อยละ 7.3 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนของบุคลิกภาพมีแนวโน้มไปทางแบบเก็บตัว ส่วนบุคลิกภาพด้านอารมณ์ส่วนใหญ่เป็นแบบปานกลางร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นแบบหัวนไหวง่ายร้อยละ 30.3 และที่น้อยที่สุดคือแบบมั่นคงร้อยละ 3.0 ค่าเฉลี่ยคะแนนของบุคลิกภาพด้านอารมณ์มีแนวโน้มไปทางแบบหัวนไหวง่าย

ลักษณะของผู้เสพยาบ้า เป็นเพศชาย ร้อยละ 95.2 ส่วนใหญ่อายุ 14-20 ปี และเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาศัยอยู่กับบิดามารดาร้อยละ 77.0 ขณะเริ่มเสพยาบ้า บิดามารดาอยู่ด้วยกันร้อยละ 73.9 บิดามารดาที่ติดสุราและบุหรี่ร้อยละ 20.6 และ 17.6 ตามลำดับ มีพี่หรือน้องที่ติดยาบ้าและสารระเหยร้อยละ 9.7 และ 0.6 มีญาติที่ติดเฮโรอีน,ฝิ่น ร้อยละ 1.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิเสธว่ามีการผลิตยาบ้าในชุมชน แต่ยอมรับว่ามีการจำหน่ายยาบ้าในชุมชนร้อยละ 73.3 โดยมีการจำหน่ายที่บ้านร้อยละ 42.4 สำหรับวิธีการเสพ

พบว่า นิยมเสพยาบ้าโดยวิธีสูบไอระเหยร้อยละ 97.0 และให้เหตุผลในการเสพว่าเพราะ
อยากลองร้อยละ 52.7 รองลงมาคือถูกเพื่อนชักชวนร้อยละ 32.1

ผลที่ได้จากการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องมีการศึกษาถึงบุคลิกภาพของผู้เสพ
ยาบ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนแก้ไข และป้องกันการแพร่ระบาดของยาบ้า
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน และควรมีการฝึกฝนทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงการเสพสาร
เสพติด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

Independent Study Title Personality of Amphetamine-like Drug Users at Northern Drug Dependent Treatment Center Chiang Mai Province

Author Miss.Jidapa Puangphet

Master of Public Health

Examining Committee:

Asst.Prof. Somsri	Pattamapun	Chairman
Assoc.Prof.Pat	Sujumnonk	Member
Asst.Prof. Sarita	Teerawatsakul	Member
Lecturer Theerarat	Boripuntakul	Member

Abstract

The objectives of the study were to examine the personality of Amphetamine-like drug users at Northern Drug Dependent Treatment Center Chiang Mai Province, including the information about their family, social environment, and history of Amphetamine-like drug abuse. One hundred and sixty-five samples were purposively selected. This study used questionnaire and Maudsley Personality Inventory (MPI) to collect the data. Descriptive statistics was used for analysis.

The results revealed that the behavioral personality of 70.9, 21.8, and 7.3 percent of samples were of ambivert, introvert, and extravert types respectively with the average score inclining towards the introvert type. For the emotional personality, 66.7, 30.3, and 3.0 percent of them were of ambivert, Neuroticism, and stability types respectively with the average score leaning towards the neuroticism type.

In general description, most of samples were male whom accounted for 95.2 percent, in 14-20 age group, and being secondary school students. Seventy-seven percent of samples, lived with their parents. They started to use the Amphetamine-like drug while their parents lived together, accounted for 73.9 percent. Twenty point six and seventeen point six percent of thin parents were alcoholic drinkers and

cigarette smokers, respectively. The percentages of their brothers or sisters who were Amphetamine-like drug and inhalant abusers were 9.7 and 0.6 respectively. Furthermore, 1.8 percent of their relatives were heroin or opium addicted. They denied that there was no Amphetamine-like drug production in the community. Seventy three point three percent of them, however, accepted that there were drug selling in their communities, with 42.4 percent of transaction occurring at home. Almost all of them, 97.0 percent, abused the Amphetamine-like drug by inhalation. The reasons for abusing the Amphetamine-like drug were self-trial and peers' temptation that accounted for 52.7 and 32.1 percent respectively.

The results of this study, indicate the necessity of having further study in the area of the personality of Amphetamine-like drug users to provide basic information for prevention and control of Amphetamine-like drug abuse, particularly in school children. Life-skill training to avoid substance abuse should also be taken to promote the efficiency of prevention and control programs.