

4.1 ปัจจัยด้านประชากรและสังคม

4.1.1 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ที่เข้ารับการอบรม จำแนกตามรุ่นที่เข้ารับการอบรม

รุ่นที่	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
1	38	14.62
2	34	13.08
3	64	24.62
4	53	20.38
5	41	15.38
6	31	11.92
รวม	260	100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 3 ร้อยละ 24.62 รองลงมาคือ รุ่นที่ 4 ร้อยละ 20.38 และรุ่นที่ 5 ร้อยละ 15.38 ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1-6 จำนวน 260 ราย

4.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
1. การตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม		
ตัดสินใจสมัครเอง	134	51.54
มีผู้แนะนำ	126	48.46
- คนในครอบครัว	94	74.60
- ญาติ	22	17.46
- เพื่อนฝูง	16	12.70
- ผู้นำชุมชน	52	46.27
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ	21	16.67
2. เพศ		
ชาย	251	93.53
หญิง	9	3.47
3. อายุ		
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี	28	10.77
21 - 30 ปี	69	26.54
31 - 40 ปี	79	30.38
41- 50 ปี	71	27.32
51 - 60 ปี	11	4.23
61 - 70 ปี	1	0.38
71 - 80 ปี	1	0.38
Mean = 34.46 SD = 10.54 Min = 15 Max = 77		
4. สถานภาพสมรส		
คู่	156	60.00
โสด	89	34.24
ม้าย	5	1.92
หย่า	5	1.92
แยก	5	1.92

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
5. ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียน	7	2.69
ประถมศึกษา	194	74.62
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	59	22.69
6. อาชีพหลักในปัจจุบัน		
ว่างงาน/ตกงาน	11	4.23
ค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว	6	2.31
รับจ้างแรงงาน	171	65.77
เกษตรกรหรือเจ้าของการผลิต	61	23.46
รับจ้างบริษัท/ห้างร้าน	5	1.92
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	0.77
นักเรียน/นักศึกษา	2	0.77
อื่น ๆ - ทหารเกณฑ์	2	0.77
7. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)		
ไม่มีรายได้	5	1.92
ต่ำกว่า 3,000 บาท	111	42.69
3,000 - 4,999 บาท	131	50.38
5,000 - 6,999 บาท	9	3.47
7,000 บาทขึ้นไป	4	1.54
8. มีโรคประจำตัว		
ไม่มี	232	89.23
มี	28	10.77

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 260 ราย ตัดสินใจในสมัครเองและมีผู้แนะนำไม่แตกต่างกัน ร้อยละ 51.54 และ 48.46 ตามลำดับ เป็นเพศชายถึงร้อยละ 93.53 อายุส่วนใหญ่ อยู่วัยแรงงาน 31-40 ปี ร้อยละ 30.38 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 27.32 และ อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 26.54 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คู่ถึงร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็น โสด ร้อยละ 34.24 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่

อยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 74.62) รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 22.69) อาชีพหลักส่วนใหญ่รับจ้างแรงงาน (ร้อยละ 65.77) และร้อยละ 23.64 มีอาชีพเกษตรกรหรือเจ้าของการผลิตรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดับ 3,000-3,999 บาท ร้อยละ 50.38 รองลงมาคือรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท (ร้อยละ 42.69) การมีโรคประจำตัวพบว่า ไม่มีโรคประจำตัวถึงร้อยละ 89.23

4.1.3 ข้อมูลด้านครอบครัว

ผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าย “ฟ้าใส” จำนวน 260 ราย แสดงข้อมูลด้านครอบครัว จำนวนสมาชิก สัมพันธภาพด้านครอบครัว รายได้รวมของครอบครัว (ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามข้อมูลด้านครอบครัว

ข้อมูลด้านครอบครัว	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
1. ลักษณะที่พักอาศัย		
เป็นของตนเอง	116	44.62
เป็นของพ่อแม่/สามี ภรรยา/ลูก	128	49.23
เป็นของญาติ	12	4.62
เช่าผู้อื่น	2	0.77
อยู่ระหว่างการเช่าซื้อ	1	0.38
อาศัยอยู่กับครอบครัว (ปลูกบ้านในที่ของผู้อื่น)	1	0.38
2. การอาศัยอยู่กับครอบครัว		
อาศัยอยู่กับครอบครัว	240	85.72
ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว	20	7.14
คนเดียว	7	2.50
ญาติ	6	2.14
อื่นๆ	7	2.50
3. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน		
1 - 3 คน	118	45.38
4 คนขึ้นไป	142	54.62

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้อมูลด้านครอบครัว	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
4. สถานะของการอยู่อาศัยในครอบครัว		
หัวหน้าครอบครัว	122	46.92
สามี/ภรรยา	13	5.00
บุตร	96	36.92
ผู้อาศัย	29	11.16
5. สัมพันธภาพของครอบครัว		
รักใคร่ปรองดองกันดี	203	78.08
ทะเลาะกันนานๆ ครั้ง	35	13.46
ทะเลาะกันเป็นบางครั้ง	17	6.54
ไม่สนใจต่างคนต่างอยู่	4	1.54
อื่นๆ เช่น อยู่คนเดียว	1	0.38
6. รายได้ครัวเรือน บาท/เดือน		
ต่ำกว่า 3,000 บาท	57	21.92
3,000 - 4,999 บาท	110	42.31
5,000 - 6,999 บาท	60	23.08
7,000 - 8,999 บาท	19	7.31
9,000 - ขึ้นไป	14	5.38
7. แหล่งรายได้หลักของครอบครัว		
ตนเอง	183	70.38
บิดา/มารดา	84	32.30
สามี/ภรรยา	97	37.31
ลูกๆ	19	7.31
ญาติ	14	5.38
8. เปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้าน		
ร่ำรวย	4	1.54
ปานกลาง	176	67.69
ยากจน	80	30.77

จากตารางที่ 3 พบว่า ลักษณะที่พักอาศัยเป็นของพ่อ แม่/สามี ภรรยา/ลูก ร้อยละ 49.23 รองลงมาคือเป็นของตนเอง ร้อยละ 44.62 การอาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 85.72 จำนวนสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 54.62 อาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คนขึ้นไป และร้อยละ 45.38 อาศัยอยู่ด้วยกัน 1-3 คนฐานะของผู้เข้ารับการอบรม ของการอยู่ในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 46.92 รองลงมา คืออยู่ในฐานะของบุตรร้อยละ 36.92 ด้านความสัมพันธ์สภาพของครอบครัว ร้อยละ 48.08 รักใคร่ปรองดองกันดี รองลงมาคือ ทะเลาะวิวาทกันนานๆ ครั้ง ร้อยละ 13.46 รายได้ครัวเรือนอยู่ในระดับต่ำ 3,000-4,999 บาท ร้อยละ 42.31 รองลงมา 5,000-6,999 บาท ร้อยละ 23.08 และต่ำกว่า 3,000 บาท ร้อยละ 21.92 ตามลำดับ รายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัวผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มาจากผู้เข้ารับการอบรมเอง ถึงร้อยละ 70.38 รองลงมามาจากสามี/ภรรยา ร้อยละ 37.31 และจากบิดา/มารดา ร้อยละ 21.11 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน ฐานะปานกลาง ร้อยละ 67.69 รองลงมาคือ ยากจน ร้อยละ 30.77 และร่ำรวยมีเพียงร้อยละ 1.54

4.1.4 ข้อมูลด้านการใช้สารเสพติดก่อนและหลังการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโครงการคืนคนดีสู่สังคมค่าย “ฟ้าใส” อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนการใช้สารเสพติดก่อนและหลังการอบรม ด้านสารเสพติดที่ทดลองใช้ครั้งแรก ระยะเวลาของการใช้สารเสพติด ปฏิบัติการตอบสนองของครอบครัว เพื่อนฝูง ที่มีผลต่อการใช้และเลิกใช้สารเสพติด (ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามการทดลองใช้ครั้งแรก

การใช้สารเสพติด	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
1. ชนิดของสารเสพติดที่ทดลองใช้ครั้งแรก		
สารระเหย (กาว เบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ)	24	9.23
ฝิ่น	3	1.15
กัญชา	33	12.69
ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน	192	73.85
อื่น ๆ	8	3.08
2. การใช้สารเสพติดก่อนใช้ยาบ้า		
ไม่เสพสารใด ๆ มาก่อน	155	59.61
สารระเหย (กาว เบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ)	24	9.23
ฝิ่น	7	2.69
กัญชา	37	14.23
ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน	51	19.61
อื่น ๆ	3	1.15

จากตารางที่ 4 พบว่าชนิดของสารเสพติดที่ผู้เข้ารับการอบรมทดลองใช้ครั้งแรก คือ ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน (ร้อยละ 73.85) รองลงมาคือกัญชา (ร้อยละ 12.69) และสารระเหย (กาว เบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ) (ร้อยละ 9.23) ตามลำดับ การใช้สารเสพติดก่อนใช้ยาบ้า พบว่าผู้เข้ารับการอบรม ไม่เสพสารใดๆ มาก่อน (ร้อยละ 54.61) รองลงมาคือยาบ้า (ร้อยละ 19.61) และกัญชา (ร้อยละ 14.23) ตามลำดับ

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามวิธีการเสพยาเสพติด

วิธีการเสพยาเสพติด	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
1. พฤติกรรมก่อนใช้ยาบ้า		
ดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์ เหล้า)	180	69.23
สูบบุหรี่	172	66.15
อื่นๆ	2	0.76
ไม่เสพยาใด ๆ มาก่อน	26	10.00
2. ระยะเวลาทั้งหมดที่เคยใช้สารเสพติด		
1 - 12 เดือน	186	71.54
13 - 24 เดือน	43	16.54
25 - 36 เดือน	27	10.38
37 - 48 เดือน	0	0.00
49 - 60 เดือน	2	0.77
61 - 72 เดือน	2	0.77
3. เคยใช้ยาบ้าตามปกติ/วัน		
น้อยกว่า 1 เม็ด	6	2.31
1-2 เม็ด	236	90.77
3-4 เม็ด	9	3.46
5 - 6 เม็ด	9	3.46
4. เคยใช้ยาบ้ามากที่สุด/วัน		
1-2	187	71.92
3-4	40	15.38
5-6	22	8.47
7-8	4	1.54
9-10	7	2.69

จากตารางที่ 5 พฤติกรรมก่อนใช้ยาบ้าพบว่า มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ที่ไม่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ 69.23 และ 66.15 ระยะเวลาทั้งหมดที่เคยใช้สารเสพติดส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 1-12 เดือน (ร้อยละ 71.54) รองลงมา 13-24 เดือน (ร้อยละ 16.54) และ 25-36 เดือน (ร้อยละ

10.38) เคยใช้ยาบ้าตามปกติ 1-2 เม็ด/วัน ร้อยละ 90.77 และเคยใช้ยาบ้ามากที่สุด/วัน 9-10 เม็ด ร้อยละ 2.69 รองลงมาคือ 7-8 เม็ด/วัน ร้อยละ 35.77

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามวิธีการเลิก/ลดเสพยาบ้า

วิธีการเลิก/ลดยาเสพติด	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
1. หลังการเลิกใช้ยาบ้าใช้สิ่งเหล่านี้ทดแทน		
ไม่ใช้	93	35.77
ใช้	167	64.23
สูบบุหรี่	109	65.27
ดื่มเหล้า	122	73.05
ดื่มเบียร์	42	25.15
อื่นๆ	2	1.20
2. วิธีการเลิกใช้สารเสพติดก่อนและหลังการอบรม		
ไม่เคย	99	38.08
เคย	161	61.92
หักดิบ	108	67.08
เลิกคบกับเพื่อนที่เสพยาเสพติด	67	41.61
การรักษาในโรงพยาบาล	6	3.73
กินยาสมุนไพร	6	3.73
อื่นๆ	5	3.10

จากตารางที่ 6 พบว่าในส่วนที่ใช้สิ่งอื่นทดแทนยาบ้า คือการใช้แอลกอฮอล์มีร้อยละ 98.20 รองลงมาคือใช้บุหรี่ทดแทน ร้อยละ 65.27 วิธีการเลิกใช้สารเสพติดก่อนและหลังการอบรม ไม่เคยเลิกมีร้อยละ 38.08 เคยเลิกร้อยละ 61.92 ในส่วนของเคยเลิกใช้สารเสพติด พบว่าใช้วิธีการหักดิบ ร้อยละ 67.08 รองลงมาคือ การเลิกคบเพื่อนที่เสพยาเสพติด ร้อยละ 41.61 และการรักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 3.73

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามสภาวะหลังการเลิกเสพยาเสพติด

สภาวะหลังการเลิกเสพยาเสพติด	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
1. สภาพร่างกายหลังเลิกเสพยาเสพติด		
กระปรี้กระเปร่ามีแรงทำงาน	188	72.31
อ่อนเพลียไม่มีแรง	11	4.23
มีความเจ็บปวดร่างกาย	6	2.31
เหมือนเดิม	51	19.62
อื่นๆ	4	1.53
2. สภาพจิตใจและอารมณ์หลังการอบรม		
มีความสุขขึ้น	203	78.08
หงุดหงิด อารมณ์เสี้ง่าย	16	6.15
ประสาทหลอน	1	0.38
เหมือนเดิม	40	15.39
3. ครอบครัวแสดงท่าทีเมื่อใช้สารเสพติด		
ให้ความรัก/ความสนใจมากขึ้น	94	36.15
เฉยๆ	27	10.38
ให้ความรัก/ความสนใจลดลง	46	17.69
โกรธต่อว่า	88	33.86
อื่นๆ	5	1.92
4. ครอบครัวแสดงท่าทีเมื่อเลิกสารเสพติด		
ให้การยอมรับท่านมากขึ้น	162	62.31
ให้ความสนใจมากขึ้น	82	31.54
เฉยๆ	13	5.00
ยังมีทำที่หว่ากระแวง	3	1.15
5. ท่าทีของเพื่อนหรือผู้ร่วมงานต่อการเสพยาเสพติด		
ให้ความรัก/ความสนใจมากขึ้น	33	12.69
เฉยๆ	96	36.92
ให้ความรัก/ความสนใจลดลง	73	28.08
โกรธ	56	21.54
อื่นๆ	2	0.77

ตารางที่ 7 (ต่อ)

มุลภาวะหลังการเลิกเสพยาเสพติด	จำนวน (n=260)	ร้อยละ (100.00)
6. ทำทีของเพื่อนหรือผู้ร่วมงานต่อการเลิกเสพยาเสพติด		
ให้การยอมรับท่านมากขึ้น	162	62.31
ให้ความสนใจท่านมากขึ้น	48	18.46
เฉยๆ	45	17.31
ยังมีทำที่หวาดระแวง	5	1.92

จากตารางที่ 7 พบว่า สภาพร่างกายหลังเลิกเสพยาเสพติดของผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความกระปรี้กระเปร่ามีแรงทำงาน (ร้อยละ 72.31) สภาพร่างกายเหมือนเดิม ร้อยละ 19.62 สภาพจิตใจและอารมณ์หลังการอบรม มีความสดชื่น ร้อยละ 78.08 มีสภาพเหมือนเดิม ร้อยละ 15.39 ครอบครัวแสดงท่าทีเมื่อรู้ว่าใช้สารเสพติด ให้ความรักให้ความสนใจมากขึ้น ร้อยละ 36.15 รองลงมาคือ โกรธต่อว่า ร้อยละ 33.86 และให้ความรักและสนใจลดลง ร้อยละ 17.69 ตามลำดับ ครอบครัวแสดงท่าทีเมื่อเลิกเสพยาเสพติด พบว่าให้การยอมรับมากขึ้น ร้อยละ 62.31 รองลงมาคือ ให้ความสนใจมากขึ้น ร้อยละ 31.54 ส่วนท่าทีของเพื่อนหรือผู้ร่วมงานต่อการเสพยาเสพติด มีปฏิกิริยาเฉยๆ ร้อยละ 36.92 รองลงมาคือ ให้ความรักและสนใจลดลง ร้อยละ 28.08 และ โกรธต่อว่า ร้อยละ 21.54 ทำทีของเพื่อนหรือผู้ร่วมงานเมื่อรู้ว่าเลิกยาเสพติด ให้การยอมรับมากขึ้น ร้อยละ 62.31 รองลงมาคือ ให้ความสนใจมากขึ้น ร้อยละ 18.46 และแสดงอาการเฉยๆ ร้อยละ 17.31 ตามลำดับ

4.2 การสนับสนุนของครอบครัว

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามการสนับสนุนของครอบครัว

การสนับสนุนของครอบครัว (n= 260)	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
1. การดูแลของครอบครัว					
1.1. การเงินและค่าใช้จ่ายส่วนตัว	24 (9.23)	51 (19.62)	159 (61.15)	17 (6.54)	9 (3.46)
1.2. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	22 (8.46)	53 (20.38)	158 (60.77)	17 (6.54)	10 (3.85)
1.3. อาหารและเครื่องบำรุงร่างกาย	29 (11.15)	77 (29.62)	132 (50.77)	16 (6.15)	6 (2.31)
1.4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ฯ	20 (7.69)	40 (15.38)	125 (48.08)	46 (17.69)	29 (11.16)
1.5. การดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย	78 (30.00)	111 (42.69)	59 (22.69)	7 (2.69)	5 (1.93)
2. การให้ความรู้สึกหรือแสดงออกของครอบครัว					
2.1. ความรักใคร่สนิทสนม	93 (35.77)	127 (48.85)	37 (14.23)	3 (1.15)	0 (0)
2.2. การให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหา	77 (29.62)	116 (44.62)	64 (24.62)	1 (0.38)	2 (0.76)
2.3. การปลอบใจเมื่อมีความทุกข์	73 (28.08)	113 (43.46)	68 (26.15)	3 (1.15)	3 (1.15)
2.4. การยอมรับจากสมาชิกใน ครอบครัว	90 (34.62)	130 (50.00)	36 (13.85)	4 (1.54)	0 (0.00)
2.5. การให้ข้อคิด/คติเตือนใจในการ ใช้ชีวิต	85 (32.69)	107 (41.15)	64 (24.62)	3 (1.16)	1 (0.38)

ตาราง 8 (ต่อ)

การสนับสนุนของครอบครัว (n = 260)	มาก	มาก	ปาน	น้อย	น้อย
	ที่สุด		กลาง		ที่สุด
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
3. การยอมรับของครอบครัว					
3.1. การได้รับผิดชอบภาระงานบ้าน	39 (15.00)	117 (45.00)	96 (36.93)	7 (2.69)	1 (0.38)
3.2. การได้รับผิดชอบหารายได้ให้ ครอบครัว	62 (23.84)	112 (43.08)	73 (28.08)	9 (3.46)	4 (1.54)
3.3. การได้พักผ่อนหย่อนใจร่วมกับ ครอบครัว	64 (24.61)	97 (37.31)	85 (32.69)	10 (3.85)	4 (1.54)
3.4. การร่วมรับประทานอาหาร	97 (37.32)	105 (40.38)	51 (19.61)	7 (2.69)	0 (0.00)
4. การให้ข้อมูลข่าวสารของครอบครัว					
4.1 โทษของยาเสพติด	84 (32.31)	102 (39.23)	59 (22.69)	12 (4.62)	3 (1.15)
4.2. การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น	46 (17.69)	114 (43.85)	88 (33.85)	9 (3.46)	3 (1.15)
4.3. วิธีการปฏิเสธยาเสพติด	89 (34.23)	100 (38.46)	51 (19.61)	10 (3.85)	10 (3.85)
4.4. การดูแลสุขภาพ	99 (38.08)	116 (44.62)	38 (14.61)	7 (2.69)	0 (0.00)
4.5. การแนะนำอาชีพ/การทำงาน	66 (25.38)	103 (39.62)	73 (28.08)	14 (5.38)	4 (1.54)

จากตารางที่ 8 พบว่า การดูแลของครอบครัวที่มีต่อผู้ผ่านการอบรมด้านความช่วยเหลือทางด้านการสนับสนุนวัสดุสิ่งของส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.77) คือ การสนับสนุนการเงินและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 60.77) อาหารและเครื่องบำรุงร่างกาย (ร้อยละ 50.77) และสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 48.08) ส่วนการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 42.69)

การแสดงความรู้สึกรู้สึกหรือแสดงออกของครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คือ ความรักใคร่สนิทสนม (ร้อยละ 48.85) การให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหา (ร้อยละ 44.62) การปลอบใจเมื่อมีความทุกข์ (ร้อยละ 43.46) การยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 50.00) และการให้ข้อคิด/คติเตือนใจในการใช้ชีวิต (ร้อยละ 41.15)

การยอมรับของครอบครัวที่มีต่อผู้ผ่านการอบรม พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คือ การได้รับผิดชอบภาระงานบ้าน (ร้อยละ 45.00) การรับผิดชอบหารายได้ให้ครอบครัว (ร้อยละ 43.08) การได้พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว (ร้อยละ 37.31) การร่วมรับประทานอาหาร (ร้อยละ 40.38)

การให้ข้อมูลข่าวสารของครอบครัวที่มีต่อผู้ผ่านการอบรม พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คือ โทษของยาเสพติด (ร้อยละ 39.23) การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น (ร้อยละ 43.85) วิธีการปฏิเสธยาเสพติด (ร้อยละ 38.46) การดูแลสุขภาพ (ร้อยละ 44.62) การแนะนำอาชีพการทำงาน (ร้อยละ 39.62)

4.3 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง (n=260)	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ค่อนข้าง เห็นด้วย	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
1. ความรู้สึกมีคุณค่าเท่ากับคนอื่น ๆ	112 (43.08)	125 (48.08)	20 (7.69)	3 (1.15)	0 (0.00)
2. ความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรไม่ เคยสำเร็จ	14 (5.38)	37 (14.23)	35 (13.46)	125 (48.08)	49 (18.85)
3. ความรู้สึกว่ามีคุณสมบัติที่ดีอยู่ใน ตัวหลายอย่าง	66 (25.38)	142 (54.62)	49 (18.85)	3 (1.15)	0 (0.00)
4. ความรู้สึกที่มีสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีเท่ากับคนอื่นในสังคม	109 (41.92)	124 (47.69)	26 (10.00)	1 (0.39)	0 (0.00)
5. ความรู้สึกพอใจในตัวเอง	91 (35.00)	127 (48.85)	36 (13.80)	6 (2.31)	0 (0.00)
6. ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง	101 (38.85)	125 (48.08)	32 (12.30)	1 (0.38)	1 (0.38)
7. ความอยากจะมีควมนับถือตัว เองให้มากกว่านี้	85 (32.69)	113 (43.46)	48 (18.46)	8 (3.07)	6 (2.32)
8. ความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่มี ประโยชน์	18 (6.92)	19 (7.31)	17 (6.53)	116 (44.62)	90 (34.62)
9. ความรู้สึกคิดว่าบางครั้งไม่มี อะไรดี	7 (2.69)	23 (8.85)	24 (9.23)	105 (40.38)	101 (38.85)
10. ความไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจ ในตัวเอง	3 (1.15)	16 (6.15)	25 (9.62)	103 (39.62)	113 (43.46)

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็น เห็นด้วย คือ ความรู้สึกมีคุณค่าเท่ากับคนอื่น (ร้อยละ 48.08) ความรู้สึกว่ามีคุณสมบัติที่ดีในตัวหลายอย่าง (ร้อยละ 54.62) ความรู้สึกมีความสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีเท่ากับคนอื่นในสังคม (ร้อยละ 47.69) ความรู้สึกพอใจในตัวเอง (ร้อยละ 48.85) ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (ร้อยละ 48.08) และความอยากจะมีเพื่อนที่ตัวเองให้มากกว่านี้ (ร้อยละ 43.46) ส่วนระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย คือ ความรู้สึกที่ตัวเองทำอะไรไม่เคยสำเร็จ (ร้อยละ 48.08) ความรู้สึกที่ตัวเองไม่มีประโยชน์ (ร้อยละ 44.62) ความรู้สึกคิดว่าบางครั้งไม่มีอะไรดี (ร้อยละ 40.38) และระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ความไม่ค่อยมี ความภาคภูมิใจในตัวเอง (ร้อยละ 43.46)

4.4 ความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม จำแนกตามความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด

ความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด (n = 260)	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
1. ความพยายามหาโอกาสทดลองใช้ยาบ้างอย่างน้อยอีกสักครั้ง	0 (0.00)	3 (1.15)	1 (0.38)	28 (10.77)	228 (87.69)
2. ไม่ว่าจะยาบ้าจะหายากเพียงใดเขาจะพยายามแสวงหาให้ได้ เพื่อเพิ่มรสชาติให้ชีวิต	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	20 (7.69)	240 (92.31)
3. การวางแผนไว้ว่าจะใช้ยาบ้าในการช่วยอ่านหนังสือหรือทำงานเฉพาะในบางครั้งเท่านั้น	1 (0.38)	1 (0.38)	2 (0.00)	26 (10.00)	230 (88.46)
4. ความไม่ปรารถนาที่จะใช้ยาบ้าเลยในชีวิต	181 (69.82)	35 (13.46)	3 (1.15)	9 (3.46)	32 (12.31)
5. ความไม่ต้องการที่จะใช้สารเสพติดทุกชนิด	168 (64.62)	43 (16.54)	11 (4.23)	9 (3.46)	29 (11.15)
6. ความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการกลับมาเสพยาบ้าของเขา	50 (19.23)	20 (7.69)	20 (7.69)	34 (13.08)	136 (52.31)

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด (n = 260)	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
7. ความพยายามที่จะเล่นดนตรี กีฬา หรือใช้เวลาว่าทำกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์	157 (60.38)	68 (26.15)	20 (7.69)	6 (2.32)	9 (3.46)
8. ความพยายามที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการต่างๆ ในการใช้ยาบ้าเพื่อเลือก วิธีใช้ที่จะทำให้สารนี้ออกฤทธิ์ได้ นานที่สุด	11 (4.23)	8 (3.08)	6 (2.31)	35 (13.46)	200 (76.92)
9. ความพยายามที่จะคบเพื่อนที่ใช้ ยาบ้าเพื่อที่จะได้มีโอกาสใช้ยาบ้าได้ ง่ายขึ้น	2 (0.77)	3 (1.15)	2 (0.77)	30 (11.54)	223 (85.77)
10. ความพยายามคบกับเพื่อนที่มีผล การเรียนดี หรือคนที่มีฐานะดีถึงแม้ว่า เขาจะใช้ยาบ้าก็ตาม	12 (4.62)	7 (2.69)	13 (5.00)	31 (11.92)	197 (75.77)
11. ความพยายามที่จะไม่ไปสถานที่ ที่มีการมั่วสุมใช้สารเสพติด	158 (60.77)	40 (15.38)	7 (2.69)	8 (3.08)	47 (18.08)
12. ความต้องการที่จะเข้าไปแสวงหา ประสบการณ์แปลกใหม่ในสถานที่ที่ มีการมั่วสุมใช้สารเสพติด	0 (0.00)	2 (0.77)	4 (1.54)	23 (8.84)	231 (88.85)
13. การจะไม่ปฏิเสธหากเพื่อส่วน ใหญ่ในกลุ่มชักชวนให้กลับมาลอง เสพยาบ้าอีก	2 (0.77)	5 (1.92)	6 (2.31)	21 (8.08)	226 (86.92)
14. ความพร้อมที่จะปฏิเสธทันทีเมื่อ เพื่อนสนิทชักชวนให้เสพยาบ้าอีก	207 (79.62)	36 (13.85)	4 (1.54)	9 (3.45)	4 (1.54)
15. ความตั้งใจว่าจะปฏิเสธการ กลับมาทดลองเสพยาบ้าอีกไม่ว่าใคร จะชักชวนก็ตาม	222 (85.38)	23 (8.85)	6 (2.31)	5 (1.92)	4 (1.54)

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติดในระดับมากที่สุด คือ ความตั้งใจว่าจะปฏิเสธการกลับมาทดลองเสพยาบ้าอีกไม่ว่าใครจะชักชวนก็ตาม (ร้อยละ 85.38) ความพร้อมที่จะปฏิเสธทันทีเมื่อเพื่อนสนิทชวนให้เสพยาบ้าอีก (ร้อยละ 79.62) ความไม่ปรารถนาที่จะใช้ยาบ้าเลยในชีวิตนี้ (ร้อยละ 69.82) ความไม่ต้องการที่จะใช้สารเสพติดทุกชนิด (ร้อยละ 64.62) ความพยายามที่จะไม่ไปสถานที่ที่มีการมั่วสุมใช้สารเสพติด (ร้อยละ 60.77) และความพยายามที่จะเล่นดนตรี กีฬา หรือใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 60.38) ส่วนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ไม่ว่าจะบ้ำจะหายากเพียงใดเขาจะพยายามแสวงหาให้ได้เพื่อเพิ่มรสชาติให้ชีวิต (ร้อยละ 92.31) ความต้องการที่จะเข้าไปแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ในสถานการณที่มีการมั่วสุมใช้สารเสพติด (ร้อยละ 88.85) การวางแผนไว้ว่าจะใช้ยาบ้าในการช่วยอ่านหนังสือหรือทำงานเฉพาะในบางครั้งเท่านั้น (ร้อยละ 88.46) ความพยายามจะหาโอกาสทคใช้ยาบ้าอย่างน้อยอีกสักครั้ง (ร้อยละ 87.69) การไม่ปฏิเสธหากเพื่อชักชวนให้กลับมาทดลองเสพยาบ้าอีก (ร้อยละ 86.92) ความพยายามที่จะคบเพื่อที่ใช้ยาบ้านเพื่อที่จะได้มีโอกาสใช้ยาบ้าได้ง่ายขึ้น (ร้อยละ 85.77) ความพยายามที่จะหาข้อมูลในการใช้ยาบ้าเพื่อให้ออกฤทธิ์ได้นานที่สุด (ร้อยละ 76.92) ความพยายามคบเพื่อที่มีผลการเรียนดีหรือคนที่มีฐานะดีถึงแม้ว่าเราจะใช้ยาบ้าก็ตาม (ร้อยละ 75.77) และความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการกลับมาเสพยาบ้าของเขา (ร้อยละ 52.31)

4.5 ปัจจัยด้านประชากรและสังคมกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

4.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัยประชากรและสังคมกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติดของผู้ผ่านการอบรม

ปัจจัยประชากรสังคม. (n = 260)	Mean	S.D.	Mean Difference	t	p-value
1. การตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม					
- ตัดสินใจสมัครเอง (n = 134)	69.24	5.73	-2.421	-3.245	0.001*
- มีผู้แนะนำ (n = 126)	66.81	6.29			
2. เพศ					
- ชาย (n = 251)	68.10	6.08	1.104	0.531	0.59
- หญิง (n = 9)	67.00	7.33			
3. อายุ					
- อายุต่ำกว่า 25 ปี (n = 55)	67.49	6.05	-0.73	-0.783	0.434
- อายุ 25 ปีขึ้นไป (n = 205)	68.22	6.14			
4. สถานภาพสมรส					
- คู่ (n = 156)	68.80	5.33	1.84	2.270	0.024*
- โสด/ม่าย/หย่า/แยก (n = 104)	66.96	7.02			
5. ระดับการศึกษา					
- ไม่ได้เรียน-ประถมศึกษา (n = 201)	68.08	5.51	0.084	0.077	0.939
- สูงกว่าประถมศึกษา (n = 59)	68.00	7.92			
6. อาชีพหลัก					
- ว่างาน , ตกงาน (n = 13)	69.07	4.31	1.06	0.610	0.542
- มีงานทำ (n = 247)	68.01	6.20			
7. รายได้บุคคล					
- ไม่เกิน 2,000 บาท (n = 95)	68.79	5.12	1.141	1.450	0.148
- 2,001 บาทขึ้นไป (n = 165)	67.69	6.61			

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ปัจจัยประชากรสังคม (n = 260)	Mean	S.D.	Mean Difference	t	p-value
8. โรคประจำตัว					
- ไม่มี (n = 232)	68.34	6.02	2.515	2.066	0.046*
- มี (n = 28)	65.82	6.58			

จากตารางที่ 11 พบว่า การตัดสินใจสมัครเองกับการตัดสินใจแบบมีผู้แนะนำมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.001) สถานภาพสมรสคู่กับโสด/ม่าย/หย่า/แยก และการไม่มีโรคประจำตัวกับการมีโรคประจำตัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value น้อยกว่า 0.05) ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้บุคคล ไม่มีความแตกต่างกัน

4.5.2 ข้อมูลด้านครอบครัวกับความตั้งใจเลิกสหยาเสพติด

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นปัจจัยด้านครอบครัวกับความตั้งใจเลิกสหยาเสพติดของผู้ผ่านการอบรม

ปัจจัยด้านครอบครัว (n = 260)	Mean	SD	Mean Difference	t	p-value
1. ลักษณะที่พักอาศัย					
- เป็นของตนเอง (n = 116)	68.71	5.44	1.158	1.520	0.130
- เป็นของพ่อแม่/สามีภรรยา (n = 144)	67.54	6.59			
2. การอาศัยอยู่กับครอบครัว					
- อาศัยอยู่กับครอบครัว (n = 241)	68.03	6.24	-0.384	-0.263	-0.793
- ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว (n = 19)	68.42	4.50			
3. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน					
- 1-3 คน (n = 118)	67.99	5.99	-0.135	-0.177	0.860
- 4 คนขึ้นไป (n = 142)	68.13	6.25			

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ปัจจัยด้านครอบครัว (n = 260)	Mean	SD	Mean Difference	t	p-value
4. ฐานะของการอยู่ในครอบครัว					
- หัวหน้าครอบครัว (n = 122)	68.86	5.16	1.498	2.014	0.045*
- สามี/ภรรยา, บุตร, ผู้อาศัย (n = 138)	67.36	6.80			
5. สัมพันธภาพของครอบครัว					
- รักใคร่ปรองดองกันดี	68.72	5.93	2.925	3.266	0.001**
- ไม่สนใจกัน , ทะเลาะกัน	65.79	6.29			
6. รายได้ของครัวเรือน					
- ไม่เกิน 2,800 บาท (n = 57)	68.39	4.97	0.411	0.447	0.655
- 2,801 บาทขึ้นไป (n = 203)	67.97	6.42			
7. รายได้หลักของครอบครัว					
- ตนเอง (n = 74)	69.08	4.54	1.420	1.980	.049*
- บิดามารดา, สามีภรรยา, ลูก, ญาติ (n = 186)	67.66	6.61			
8. เปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้าน					
- ร่ำรวย , ปานกลาง (n = 180)	68.10	6.28	0.112	0.136	0.892
- ยากจน (n = 80)	67.99	5.79			

จากตารางที่ 12 พบว่าสัมพันธภาพของครอบครัว ความรักใคร่ปรองดองกันดีกับความไม่สนใจกัน ทะเลาะกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.001) ฐานะของการอยู่ในครอบครัวระหว่างฐานะหัวหน้าครอบครัวกับ ฐานะสามี/ภรรยา/บุตร/ผู้อาศัย และรายได้ของครอบครัวระหว่างตนเองกับ บิดามารดา/สามีภรรยา/ลูก/ญาติ ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value น้อยกว่า 0.05) ส่วนลักษณะที่พัวอาศัย การอาศัยอยู่กับครอบครัว จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน และการเปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้านพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

4.5.3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นการใช้สารเสพติดก่อน/หลังของผู้ผ่านการอบรมกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นการใช้สารเสพติดก่อน/หลังของผู้ผ่านการอบรมกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

การใช้สารเสพติด (n = 260)	Mean	S.D.	Mean Difference	t	p - value
1. ชนิดของสารเสพติดที่ทดลองใช้ครั้งแรก					
- ยาบ้า (n = 192)	68.41	5.90	1.323	1.536	0.126
- ฟีน, กัญชา, เฮโรอีน, สารระเหย (n = 68)	67.09	6.65			
2. การใช้สารเสพติดก่อนใช้ยาบ้า					
- ไม่เสพยาใด ๆ มาก่อน (n = 155)	68.74	5.82	1.675	2.181	0.030*
- เสพ (n = 105)	67.07	6.43			
3. พฤติกรรมก่อนใช้ยาบ้า					
- ไม่เสพยาใด ๆ มาก่อน (n = 26)	68.27	5.14	0.226	0.179	0.858
- คี๋มเหล้า, เบียร์, สูบบุหรี่, อื่นๆ (n = 234)	68.04	6.23			
4. ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ยาบ้า					
- 1-12 เดือน (n = 186)	68.61	5.54	1.924	2.305	0.022*
- 13 เดือนขึ้นไป (n = 74)	66.69	7.24			
5. เคยใช้ยาบ้าตามปกติ เม็ด / วัน					
- 0-1 เม็ด (n = 200)	68.63	5.69	1.277	1.419	0.157
- 2 เม็ดขึ้นไป (n = 60)	67.08	7.35			
6. เคยใช้ยาบ้ามากที่สุด เม็ด/วัน					
- 0-2 เม็ด (n = 187)	68.34	5.60	1.005	1.064	0.290
- 3 เม็ดขึ้นไป (n = 73)	67.34	7.27			
7. หลังการเลิกใช้ยาบ้าใช้สิ่งอื่นทดแทน					
- ไร่ (n = 167)	7.56	6.79	1.405	1.982	0.049*
- ไม่ไร่ (n = 93)	68.97	4.59			

ตารางที่ 13 (ต่อ)

การใช้สารเสพติด (n = 260)	Mean	S.D.	Mean Difference	t	p - value
8. วิธีการเลิกใช้สารเสพติด ก่อน/หลังการอบรม					
- ไม่เคย (n = 99)	68.13	5.83	0.106	0.136	0.892
- เคย (n = 161)	68.02	6.31			
9. สภาพร่างกายหลังเลิกเสพยาเสพติด					
- กระปรี้กระเปร่ามีแรงทำงาน (n = 188)	68.52	5.89	1.646	1.951	0.052
- อ่อนเพลียไม่มีแรง,เจ็บปวด,เหมือนเดิม (n = 72)	66.87	6.57			
10. สภาพจิตใจและอารมณ์หลังการอบรม					
- มีความสดชื่น (n = 230)	68.49	5.91	1.948	2.138	0.033*
- หงุดหงิดอารมณ์เสื่อง่าย,ประสาท หลอน เหมือนเดิม (n = 57)	66.54	6.66			
11. ครอบครัวแสดงท่าทีเมื่อใช้สารเสพติด					
- ให้ความรักความสนใจมากขึ้น(n=44)	67.03	6.59	-1.619	2.061	0.040*
- เฉยๆ , ให้ความรักความสนใจลดลง โกรธต่อว่า (n = 166)	68.65	5.78			
12. ครอบครัวแสดงท่าทีเมื่อเลิกสารเสพติด					
- ให้การยอมรับ, ให้ความสนใจมากขึ้น (n=244)	68.42	5.89	5.80	3.761	0.000*
- เฉย ๆ , ยังทำที่ระแวง (n = 16)	62.62	7.19			
13. ท่าทีของเพื่อนร่วมงานต่อการเสพยาเสพติด					
- ให้ความรัก , ความสนใจมากขึ้น(n=33)					
- เฉยๆ, ให้ความรักความสนใจลดลง โกรธ (n = 227)	66.51	6.06	-1.775	-1.561	0.120
	68.29	6.11			
14. ท่าทีของเพื่อนร่วมงานต่อการเลิกเสพยาเสพติด					
- ให้การยอมรับ,ความสนใจมากขึ้น (n=210)	68.28	6.02	1.146	1.190	0.235
- เฉยๆ , ยังมีทำที่หวาดระแวง (n = 50)	67.14	6.50			

จากตารางที่ 13 พบว่า ครอบครัวแสดงท่าทีเมื่อเลิกสารเสพติดระหว่างให้การยอมรับ, ให้ความสนใจมากขึ้น กับ เผลๆ, ยังมีท่าทีระแวง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value น้อยกว่า 0.001) พบว่า หลังการเลิกใช้ยาบ้าระหว่างการ ใช้สิ่งอื่นทดแทนกับการ ไม่ใช้สิ่งอื่นทดแทน สภาพจิตใจและอารมณ์หลังการอบรมระหว่างมีความสดชื่นกับอาการหงุดหงิดอารมณ์เสีง่าย, ประสาทหลอน เหมือนเดิม ครอบครัวแสดงท่าทีเมื่อใช้สารเสพติด ระหว่างให้ความรักความสนใจมากขึ้นกับการแสดงท่าทีเฉยๆ ให้ความรักความสนใจลดลง, โกรธต่อว่า การใช้สารเสพติดช่วงที่ใช้ยาบ้า ระหว่างการ ไม่เสพยาใดๆ กับเสพยาและระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ยาบ้า ระหว่าง 1-12 เดือน กับ 13 เดือนขึ้นไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value น้อยกว่า 0.05) ส่วนชนิดของสารเสพติดที่ทดลองใช้ครั้งแรก พฤติกรรมก่อนใช้ยาบ้า การใช้ยาบ้าตามปกติ เม็ด/วัน การใช้ยาบ้ามากที่สุด เม็ด/วัน วิธีการเลิกใช้สารเสพติด ก่อน/หลัง สภาพร่างกายหลังเลิกใช้ยาบ้า ท่าทีของเพื่อนร่วมงานต่อการ ใช้สารเสพติด และท่าทีของเพื่อนร่วมงานต่อการเลิกเสพยาเสพติด พบว่าไม่แตกต่างกัน

4.6 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ของความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและการสนับสนุนของครอบครัวกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

ตัวแปร	ความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง	.274**
การสนับสนุนของครอบครัว	.326**

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จากตารางที่ 14 พบว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p\text{-value} = 0.01$ ($r = .274$) และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p\text{-value} = 0.01$ ($r = .326$)