ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ผลของกลุ่มการบำบัดต่อการ เปลี่ยนแปลงอัตม โนทัศน์ของผู้ป่วย อัมพาตครึ่งล่าง

ชื่อผู้เชียน

พันตรีหญิง กัลยา ไผ่เกาะ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาชาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ :

รองศาสตราจารย์ อุบล นิวัติชัย ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ คุณพันธ์ กรรมการ

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง เพื่อ ศึกษาผลของกลุ่มการบำบัดต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ชองผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง ที่รับไว้รักษาที่หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 และ 5 โรงพยาบาลพระมง-กุฎเกล้า จำนวน 10 คน คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มตัวอย่างจะเช้าร่วมกลุ่ม การบำบัด ซึ่งเป็นลักษณะกลุ่มปิด พบกัน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที กลุ่มการบำบัดเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดระบาย อภิปรายอย่างอิสระและกว้างชวาง โดยมีการ กำหนดเป้าหมายที่แน่นอน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนกลุ่มการบำบัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบวัด อัตมโนทัศน์ของเทนเนสซี่ ที่อำไพ ศิริพิพัฒน์ แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งแบบวัดอัตมโนทัศน์เทนเนสซี่ นี้ ได้มีการทดสอบความเชื่อมั่นโดยคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่า ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 การรวบรวมข้อมูลจัดกระทำ 2 ครั้ง คือ ก่อนเริ่มกลุ่มการบำบัดและ หลังสิ้นสุดกลุ่มการบำบัด ซึ่งกระบวนการกลุ่มจะวิเคราะห์และประเมินผลตามรูปแบบของฟาร์แรล เพื่อดูความก้าวหน้าของกลุ่มและวิเคราะห์ปัจจัยบำบัดตามแนวคิดของยาลอม ส่วนคะแนนอัตม—โนทัศน์ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกำกับของวิลคอกชอน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

- คะแนนอัตมโนทัศน์โดยส่วนรวม ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง ก่อนเข้ากลุ่มการบำบัด กับหลังเข้ากลุ่มการบำบัด มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน อัตมโนทัศน์โดยส่วนรวม หลังเข้ากลุ่มการบำบัดสูงกว่าก่อนเข้ากลุ่มการบำบัด
- 2. คะแนนอัตมโนทัศน์ด้านความเป็นเอกลักษณ์ ด้านร่างกาย ด้านครอบครัว ด้านความ พึงพอใจ และด้านสังคมของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง ก่อนเข้ากลุ่มการบำบัดกับหลังเข้ากลุ่มการบำบัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .01, .01, .05,และ .05 ตามลำดับ โดยคะแนนอัตมโนทัศน์เพิ่มสูงชั้นหลังเข้ากลุ่มการบำบัด และคะแนนอัตมโนทัศน์ด้านพฤติกรรมด้าน ศีลธรรมจรรยา และด้านส่วนตัว ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนเข้ากลุ่มการบำบัดกับหลังเข้ากลุ่มการบำบัด
- 3. คะแนนอัตมโนทัศน์การวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนเข้า กลุ่มการบำบัดกับหลังเข้ากลุ่มการบำบัด

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved Thesis Title Effect of Therapeutic Group on Self Concept Alteration of Paraplegic Patients

Author

Major Kanlaya Paikoh

M.N.S.

Mental Health and Psychiatric Nursing

Examining Committee:

Assist. Prof. Dr. Prakin Suchaxaya Member
Assist. Prof. Aunnop Koonphandh Member

## Abstract

The purpose of this one group pretest and posttest quasiexperimental research design was to investigate the effect of
therapeutic group on self concept alteration of paraplegic patients.
The samples consisted of ten paraplegic patients treated in the
rehabilitaion department of Pramongkutklao hospital. The samples
participated in the closed therapeutic group twice a week for six
weeks. Each session lasted for one and a half hours, and samples
engaged in non agenda discussion.

The research instruments were therapeutic group program which was developed by the researcher and Tennessee Self Concept Scale which was translated by Ampai Siripipat. The reliability of Tennessee Self Concept Scale tested by Cronbach's coefficient was 0.91. Self Concept

Scale was measured before and after therapeutic group participation. Farrell Group Processing System and Yalom Curative Factors were used in analysing the group process. Self concept score was analysed by using mean and standard deviation. The hypothesis was tested by Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test.

The results were as follows:

- 1. The total self concept score, which showed difference between before and after therapeutic group participation, was increased significantly at .05 level.
- 2. The scores of identity self, physical self, family self, self satisfaction, and social self, which showed difference between before and after therapeutic group participation, were increased significantly at .01, .01, .01, .05, and .05 respectively. The scores of behavior self, moral-ethical self, and personal self showed no difference between before and after therapeutic group participation.
- 3. The score of self criticism showed no difference between before and after therapeutic group participation.

ลิขสิทธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved