

ชื่อวิทยานิพนธ์	การเผชิญความเครียดของสตรีจีนที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี		
ชื่อผู้เขียน	นางหวาง ยู่เจิ้ง		
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก		
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	
	รองศาสตราจารย์พรหมพิไล ศรีอาภรณ์	กรรมการ	
	รองศาสตราจารย์นันทา เล็กสวัสดิ์	กรรมการ	
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี พองแก้ว	กรรมการ	
	ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงหุ้ย หย่าเพย	กรรมการ	

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการเผชิญความเครียด และ ประสิทธิภาพของการเผชิญความเครียดของสตรีจีนที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ และ เปรียบเทียบ การใช้และประสิทธิภาพของรูปแบบการเผชิญความเครียดของสตรีจีนที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ ในกลุ่มอายุต่างกัน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงบรรยายเปรียบเทียบ การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างคือ สตรีจีนจำนวน 50 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง อวัยวะสืบพันธุ์ และรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เวสต์ ไซน่า เมืองเซินคุ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดการเผชิญความเครียดของจาโลวิค ชุดที่ปรับปรุงใหม่ (Revised Jaloveice Coping Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของครุสคาล-วอลลิส (Kruskal - Wallis One-Way analysis of Variance)

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างสตรีจีนใช้วิธีเผชิญความเครียดหลายวิธี จากรูปแบบการเผชิญความเครียดที่แตกต่างกัน รูปแบบการเผชิญความเครียดที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุด และให้ความเห็นว่ามีประสิทธิภาพมาก คือ การคิดและมองในแง่ดี (optimistic) และการใช้ระบบสนับสนุน (supportant) รูปแบบที่มีผู้ใช้ในลำดับรองลงมา ได้แก่ การทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น (palliative) การพึ่งพาตนเอง (self-reliant) และการเผชิญหน้ากับปัญหา (confrontive) ส่วนรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างใช้น้อยที่สุด และให้ความเห็นว่ามีประสิทธิภาพน้อย คือ การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก (emotive) การปล่อยไปตามโชคชะตา (fatalistic) และการหลีกเลี่ยงปัญหา (evasive) ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการเผชิญความเครียด และประสิทธิภาพของรูปแบบการเผชิญความเครียดในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน 3 กลุ่มอายุ พบว่า การใช้รูปแบบการเผชิญความเครียดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เฉพาะรูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก และการหลีกเลี่ยงปัญหา ส่วนประสิทธิภาพของรูปแบบการเผชิญความเครียดที่ใช้ไม่พบว่ามีผลแตกต่างกันระหว่าง 3 กลุ่มอายุ

VII

Thesis Title Coping of Chinese women with gynecologic
Cancer

Author Wang Yuqiong

M. N. S. Maternal and Child Nursing

EXAMINING COMMITTEE

Assistant Professor	Dr.Sujitra Tiansawad	CHAIRMAN
Associate Professor	Punpilai Sriareporn	MEMBER
Associate Professor	Nunta Leksawasdi	MEMBER
Assistant Professor	Dr.Warunee Fongkaew	MEMBER
Professor	Yue Yafei	MEMBER

Abstract

The purposes of this study were: 1) to describe the use of coping of Chinese women with gynecologic cancer, 2) to determine the effectiveness of coping used by Chinese women with gynecologic cancer, and 3) to compare the use and effectiveness of coping of Chinese women with gynecologic cancer of different age groups. A comparative descriptive design was used in this study. A purposive sampling method was used to draw the subjects for the study. The sample of 50 women with gynecologic cancer was obtained from the second

VIII

teaching hospital, West China University of Medical Sciences in Chengdu, China. The use and effectiveness of coping were examined by using the revised Jalowiec Coping Scale. Descriptive statistics and Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance were used for data analysis.

Results of this study indicated that the women with gynecologic cancer used multiple coping strategies of different coping styles. Optimistic and supportant coping styles were reported as the most frequently used and very helpful, followed by palliative, self-reliant and confrontive coping styles. The emotive coping style was reported the least frequently used and least helpful, followed by fatalistic and evasive coping styles. There were significant differences in the use of emotive and evasive coping styles of Chinese women with gynecologic cancer of different age groups. No significant difference existed among age groups for the effectiveness of coping used.