



เชื่อมั่น 0.88

ผลการศึกษา พบว่า จำนวนเกือบครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (49.23 %) มีคะแนน  
อัตตมโนทัศน์สูงเช่นเดียวกับองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของอัตตมโนทัศน์ ยกเว้นองค์ประกอบด้านความ  
คิด ความคาดหวังในตัวเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (61.54 %) มีคะแนนอยู่ในระดับสูง

จากผลการศึกษานี้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการพยาบาลเพื่อส่งเสริมอัตต-  
มโนทัศน์ในทางบวก แก่ผู้ป่วยจิตเภทในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการ  
ศึกษาต่อไป



## VIII

draw 130 subjects for the study. Demographic Form and Self-concept Scale(SCS) developed by the researcher were used for data collection. Internal consistency reliability coefficient level of SCS was .88.

Results of this study revealed that nearly half of subjects (49.23%) had high score of self-concept as well as its components, except on self-ideal/self-expectancy. Majority of subjects (61.54%) showed high score of self-ideal/self-expectancy.

It can be implicated from this study that nurses should provide appropriate nursing care to promote and enhance schizophrenic patients to gain more positive self-concept during the rehabilitation period. Results can be used as a supportive evidence for further study.