

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 มีคะแนนการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวอยู่ในระดับสูง
2. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.33 มีคะแนนการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้ด้านความสามารถในการตัดสินใจอยู่ในระดับสูง ส่วนความสามารถด้านความรู้และความสามารถด้านทางปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง
3. มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว และความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ($r_s = .34$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ($r_s = .44$) ส่วนความสามารถด้านความรู้และการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว

Thesis Title Family Social Support and Self-care
Ability among Stroke Survivors

Author Miss Li Xiaoying

M.N.S. Medical and Surgical Nursing

Examining Committee:

Assistant Professor Dr. Paungpayom Panya	Chairman
Instructor Dr. Sirirat Panuthai	Member
Associate Professor Dr. Sukanya Parisunyakul	Member
Professor Zhang Shulin	Member

Abstract

The purpose of this descriptive correlational study was to describe family social support and self-care ability, and to determine the relationship between family social support and self-care ability among stroke survivors. Orem's self-care theory was used as a theoretical framework. Sixty stroke survivors were recruited from the Outpatient Department of Neurology in the Huashan Hospital and the Zhongshan Hospital, Shanghai Medical University, P. R. China.

The instruments used in this study were the Demographic Data Record Form, the Modified Appraisal of

VIII

Stroke Self-care Ability (MSSA) Scale and the Modified Perceived Social Support from Family (MPSS-Fa) Scale. Five nursing experts from Chiang Mai University and two nursing experts from Shanghai Medical University examined the validity of the instruments. The reliability of the MSSA Scale and the MPSS-Fa Scale were .91 and .73 respectively. Data were analyzed in terms of descriptive analysis and Spearman's rank-order correlation by using the Statistical Package for Social Science (SPSS).

The results of the study indicated that:

1. Stroke survivors (80%) perceived a high level of family social support.
2. Stroke survivors (93.33%) presented a high level of self-care ability. For the subparts, the sample presented a high level of decision making but presented a moderate level of knowledge and productive operation.
3. There was a significantly moderate and positive relationship between family social support and the self-care ability among stroke survivors ($r_s = .34, p < .01$). Family social support was also significantly, moderately and positively correlated with self-care ability regarding productive-operation ($r_s = .44, p < .01$) but was not related with either knowledge or decision-making at .05 level.

Based on these findings, the implications for nursing theory, practice, education, and research as well as recommendations for further study were provided.