

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา

ชื่อผู้เขียน ประไพ ทายุทธ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาราวรรณ | ดีะปิ่นตา | ประธานกรรมการ |
| อาจารย์สมบัติ | สกุลพรรณ | กรรมการ |
| รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ | ธงชัย | กรรมการ |
| อาจารย์ ดร. ภัทธาภรณ์ | ท่งปิ่นคำ | กรรมการ |

บทคัดย่อ

ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรามีโอกาสสูงในการกลับมาป่วยซ้ำ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังและก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมเศรษฐกิจ การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะเอื้อให้ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรมีวิธีการปรับตัว และเผชิญปัญหาได้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้อัตราการป่วยซ้ำลดลง การวิจัยเชิงพรรณนาคั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคม และแหล่งสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่รับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2545 จำนวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม และแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่พัฒนาโดยศิริภา นันทพงษ์ (2542) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

1) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.56 รับรู้การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม อยู่ในระดับสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ($\bar{X}=131.37$, $SD=19.41$) ในรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้การ

สนับสนุนทางสังคมด้านการได้รับความรักใคร่ผูกพันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนด้านการได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเองเป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ร้้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.21

2) แหล่งสนับสนุนทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ บุคลากรด้านสุขภาพ (ร้อยละ 98.41) หน่วยบริการที่จัดให้ในชุมชน (ร้อยละ 93.65) เพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 88.89) และ ญาติ (ร้อยละ 85.71) ส่วนแหล่งสนับสนุนทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่พบน้อยที่สุดคือ บุตร (ร้อยละ 41.27)

ผลการศึกษารั้้นี้ทำให้ทราบถึงการสนับสนุนทางสังคมและแหล่งสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา ซึ่งสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคลกลุ่มนี้ต่อไป

Independent Study Title Social Support of Person with Alcohol Induced Psychotic Disorder

Author Miss Prapai Tayayutt

M.N.S. Mental Health and Psychiatric Nursing

Independent Study Examining Committee:

| | | |
|-------------------------|------------|----------|
| Asst. Prof. Dr. Darawan | Thapinta | Chairman |
| Lect. Sombat | Skulphan | Member |
| Assoc. Prof. Chaweewan | Thongchai | Member |
| Lect. Dr. Patraporn | Tungpunkom | Member |

Abstract

The person with alcohol induced psychotic disorder has high relapse and developed to be a chronic case that induced physical, mental and socioeconomic problem. Social support is accepted to be one of important factors facilitating clients to have appropriate coping and also to recurrent rate. The purpose of this descriptive research was to examine social support and social support resources of person with alcohol induced psychotic disorder. Purposive sampling was used to recruit 63 subjects, with alcohol induced psychotic disorder, who admitted at Suanprung Hospital, Chiang Mai Province during January, 2002 to March, 2002. The research instrument was an interview which consisted of two parts: 1) Demographic Data 2) Social Support and Social Support Resources developed by Sirinapa Nuntapong (1999). Obtained data were analyzed using descriptive statistics.

The major results revealed that

1) Fifty five point five six percent of the subjects reported a higher level of perceived total social support than a mean score of the samples. ($\bar{X}=131.37$, $SD=19.41$). Social support in

term of attachment, was most perceived with fifty seven point one four percent. Whereas, social support regarding the reassurance of worth was least perceived (49.21%).

2) The most common resources of social support found in this study were health professionals (98.41 %), community agency (93.65 %), neighbor or co-worker (88.89%), and relatives (85.71%) whereas, the least mentioned resource was children either daughters or sons (41.27%).

This study indicate that basic understanding of social support and social support resource of person with alcohol induced psychotic disorder could be adopted as a basic information for nursing care plan and implementation for this group.