



ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลรับรู้ว่าคุณที่เป็น โรคจิตเภทมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 62.09 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน ได้แก่ ด้านการดูแลตนเอง ร้อยละ 70.75 ด้านการควบคุมอารมณ์ ร้อยละ 69.55 ด้านการติดต่อทางสังคม ร้อยละ 60.60 ด้านการสื่อสาร ร้อยละ 64.78 และด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ร้อยละ 62.69

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาวางแผนให้การส่งเสริมทักษะของผู้ดูแลในการจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของคุณที่เป็น โรคจิตเภทให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการติดต่อทางสังคม และด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนต่ำกว่าด้านอื่น

**Independent Study Title** Social Behavior of Persons with Schizophrenia as Perceived by  
Caregivers

**Author** Mrs. Ratee Puboon

**M.N.S.** Mental Health and Psychiatric Nursing

**Independent Study Examining Committee:**

Lect. Dr. Patraporn	Tungpunkom	Chairman
Asst. Prof. Srinuan	Wiwatkunupakan	Member
Lect. Dr. Hunsu	Sethabouppha	Member
Asst. Prof. Wanpen	Eamjoy	Member

**Abstract**

Schizophrenia is a chronic disease. The problems generally found in persons with schizophrenia including disruptive behavior, hostility, bizarre behavior, and deviate behavior from social norms. Moreover, if caregivers perceived that the persons with schizophrenia caused problem, it might lead to the feelings of burnout and hopelessness in providing care.

The purpose of this descriptive study was to examine the social behavior of persons with schizophrenia as perceived by caregivers. A purposive sampling is adopted to recruit sample which consisted of 335 caregivers attending at the Outpatient Department of Nakhon Sawan Psychiatric Hospital, Nakhon Sawan Province during February 2002 to April 2002. The instrument was a questionnaire which consisted of The Demographic Data Record Form developed by researcher and The Social Behavior of Persons with Schizophrenia Questionnaire modified by Patraporn Tungpunkom (2000). Data were analyzed by using descriptive statistics.

The results revealed that the total scores of social behavior of persons with schizophrenia as perceived by caregivers were at high level (62.09%). Considering each aspect, the score of all aspects of social behavior of persons with schizophrenia as perceived by caregivers were also at high level. These included self care (70.75%), nonturbulence (69.55%), social contact (60.60%), communication (64.78%), and responsibility (62.69%). These findings of this study could be applicable as a basic information planning to promote the better skills of caregivers in order to manage the social behavior of persons with schizophrenia especially in the aspect of social contact and responsibility.