

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน  
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง

ชื่อผู้เขียน นางสาวกชพร พงษ์รัตนสวัสดิ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ อุบล	นิติชัย	ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร. ภัทราภรณ์	ทุ่งปิ่นคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล	วิวัฒน์คุณูปการ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์		กรรมการ

#### บทคัดย่อ

ผู้คิดสารเสพติดส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแปรปรวนร่วมด้วย ถ้าการคัดกรองไม่ละเอียด จะทำให้การดูแลเป็นไปอย่างไม่ครอบคลุม การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากประชากรผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2545 จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามบุคลิกภาพ (PDQ-4 : Personality Diagnostic Questionnaires-4) ของ ไฮเลอร์ (Hyer, 1994) โดยใช้เทคนิคการแปลย้อนกลับและหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการทดสอบซ้ำ ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่าผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน จำนวน ร้อยละ 72.33 มีบุคลิกภาพแปรปรวน โดยมีบุคลิกภาพประเภทย้ำคิดย้ำทำ ร้อยละ 13.51 รองลงมาเป็นประเภทหวาดระแวง ร้อยละ 12.48 ประเภทหลีกเลี่ยง ร้อยละ 11.30 ประเภทแยกตนเอง ร้อยละ 8.22 ประเภทพึ่งพา ร้อยละ 6.90 และประเภทเรียกร้องความสนใจมากเกินไป ร้อยละ 6.46 ตามลำดับ

ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนมีบุคลิกภาพ  
แปรปรวนร่วมด้วย ดังนั้นการช่วยเหลือเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคควรพิจารณาถึงโรคร่วม  
เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University

**Independent Study Title**            Personality Disorder of Persons with Amphetamine Induced  
Psychotic Disorder at Suanprung Psychiatric Hospital

**Author**                                    Miss. Kotchaphon Phongrattanasawat

**M.N.S.**                                     Mental Health and Psychiatric Nursing

**Independent Study Examining Committee:**

Assoc. Prof. Ubol	Niwatichai	Chairman
Lect. Dr. Patraporn	Tungpunkom	Member
Asst. Prof. Srinuan	Wiwatkunupakan	Member
Asst. Dr. Taweeluk	Vannarit	Member

**Abstract**

Persons with substance abuse mostly found having personality disorder. Therefore, screening procedure should be emphasised to enhance the comprehensive care. The purpose of this descriptive study was to examine the personality disorder of persons with amphetamine induced psychotic disorder. The subjects were selected by purposive sampling and consisted of 159 persons with amphetamine induced psychotic disorder who admitted at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiangmai province during May to June, 2002. The research instrument was Personality Diagnostic Questionnaire-4 (PDQ-4) developed by Hyler (1994) and using the technique of back translation, and reliability was confirmed by test-retest method. Data were analyzed by descriptive statistics.

The results revealed that 72.33 percent of the subjects reported as having personality disorder. Considering to each type of personality disorder, it is found that 13.51 percent of the subjected having the obsessive compulsive personality disorder, followed by paranoid personality

disorder (12.48%), avoidant personality disorder (11.30%), schizoid personality disorder (8.22%), borderline personality disorder (6.90%), and histrionic personality disorder (6.46%) respectively.

The findings of this study indicate the comorbidity of the personality disorder in persons with amphetamine induced psychotic disorder. Therefore, health care providers should be considered this comorbidity in order to provide care comprehensively.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University