

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในพลอยโดยไม่ทำลายตัวอย่าง โดยวิธีวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน

ชื่อผู้เขียน

น.ส. กรณีกิริ ภูมิประหมั่น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนเคมี

คณะกรรมการสอนการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

ผศ. ดร. อรอนงค์ อาร์คิโร

ประธานกรรมการ

รศ. ดร. อุ่น ศรีโยรา

กรรมการ

ผศ. ดร. เรืองศรี วัฒนาสก

กรรมการ

บทคัดย่อ

ได้ทำการวิเคราะห์ธาตุในพลอยตัวอย่าง จากร้านค้าบางแห่ง ในจังหวัดเชียงราย เขียงใหม่ และจากน่อพลอยกาญจนบุรี โดยวิธีวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชันแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้คลิฟอร์เนียม – 252 เป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอน จากนั้นทำการวัดรังสีแกรมมาที่ได้จากการถ่ายตัวของไฮโซไทปัมมันตังสีที่เกิดจากธาตุต่างๆ ในพลอยที่พังงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์ทางคุณภาพพบว่ามีพีคแกรมมา 3 พีค ที่พังงานประมาณ 844 – 846 keV, 1014 keV และ 1779 keV ซึ่งเป็นพีคของแมกนีเซียมกับแมกนีส แมกนีเซียม และ อลูมิเนียม ตามลำดับจากพื้นที่ได้พีคสามารถหาปริมาณอลูมิเนียมในพลอยตัวอย่างได้ตั้งแต่ 0 % ถึง 96 % โดยมวล ส่วนแมกนีเซียม และแมกนีสมีปริมาณน้อยมากจนหาค่าไม่ได้

Research Title Nondestructive Determination of Elements in Gems by
Neutron Activation Analysis

Author Miss. Khunnigar Poomparmun

M.S. Teaching Chemistry

Examining Committee

Asst. Prof. Dr. Orn – anong Arquero	Chairman
Assoc. Prof. Dr. Udom Sriyotha	Member
Asst. Prof. Dr. Riangsri Watanesk	Member

ABSTRACT

Determination of elements in gem samples from some gem shops in Chiang Rai, Chiang Mai provinces and from Kanjanaburi gempit were performed nondestructively by neutron activation analysis using californium – 252 as a neutron source. The gamma radiations from radioisotope decay generated from elements in gem samples at appropriate energies were then measured. Three gamma peaks at energies of about 844 – 846 keV, 1014 keV and 1779 keV for magnesium and manganese, magnesium, and aluminium, respectively, were observed qualitatively. The amounts of aluminium in gem samples obtained from peak areas varied from 0 % to 96 % by mass, whereas those of magnesium and manganese could not be measured significantly.